



INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ

**ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNJIŠTVA
TOPLIČKOG OKRUGA U PERIODU 2012-2016.GOD.**

Niš, decembar 2017.

Uvod

Prema jednoj od novijih definicija **zdravstveno stanje** je «*opis i/ili merenje zdravlja pojedinca, grupe ili celokupne populacije prema prihvaćenim standardima uz pomoć zdravstvenih indikatora*».

Zdravstveni indikatori ili pokazatelji su osnovni instrumenti pomoću kojih se procenjuje stanje zdravlja stanovništva. Idealnog zdravstvenog indikatora (validan, objektivan, senzitivan i specifičan) nema, bez obzira na napore koji su u traganju za objektivnim merilima zdravlja učinjeni kroz vekove.

Paralelno sa razvojem društva menjao se i pristup zdravlju. Procena (analiza) zdravstvenog stanja stanovništva prolazila je kroz **više faza**, a u skladu sa nastalim promenama, menjali su se i pokazatelji korišćeni za procenu zdravlja populacije.

Poslednjih decenija menja se pristup merenju zdravstvenog stanja stanovništva od „negativnog“ (fokusiranog na bolest) ka „pozitivnom“ aspektu zdravlja koji je zasnovan na percepciji zdravlja, funkcionisanju i mogućnosti adaptacije u životnoj sredini. Ovakav pristup podrazumeva da se za procenu koriste pokazatelji životnog stila i kvaliteta života.

U isto vreme, sa pojavom tzv. «pokreta za indikator», došlo je do značajnih pomaka u ovoj oblasti javnog zdravstva. «Pokret za indikator» su započele Ujedinjene nacije, ali je nastavljen i unapređen kroz programe razvoja indikatora koje vodi Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). Insistira se na tesnoj povezanosti zdravlja i ekonomskog rasta, pa su i preporučeni pokazatelji koji mere vrednosti u zdravlju dobijene za uloženi novac („value for money“).

Većina novijih indikatora jesu kompozitni pokazatelji (složene mere zdravlja) za koje bi, prema preporukama iz literature, trebalo koristiti termin „indeks“ zdravlja. U Srbiji se po prvi put pristupilo određivanju DALY indeksa 2003.god. u okviru projekta koji je finansirala EU pod rukovodstvom Evropske agencije za rekonstrukciju.

Zdravstveni informacioni sistem (u našoj zemlji) se menjao, ali sporo i često nefunkcionalno, tako da ne obezbeđuje dovoljno adekvatnih i kvalitetnih podataka koji bi pratili promene u načinu merenja/procene zdravstvenog stanja stanovništva.

Ciljevi procene zdravstvenog stanja stanovništva su:

- očuvanje i unapređenje zdravstvenog stanja stanovništva
- praćenje promena zdravstvenog stanja tokom vremena
- identifikovanje prioritetnih zdravstvenih problema
- uočavanje i analiza razlika između pojedinih teritorija ili populacionih grupa
- preispitivanje zdravstvene politike, strategije zdrav. zaštite i zdravstvene tehnologije
- unapredjenje menadžmenta u zdravstvu.

Kao **izvor podataka** korišćeni su: podaci i publikacije Republičkog zavoda za statistiku (www.stat.gov.rs), izveštaji rutinske zdravstvene statistike (koje prema Zakonu o evidencijama u zdravstvu, sve službe zdravstvenih ustanova dostavljaju Centru za informatiku i biostatistiku u zdravstvu IZJZ-Niš), dostupne baze podataka iz individualnih statističkih izveštaja, Izveštaj o radu Instituta i baza podataka o zaraznim bolestima i imunoprofilaksi,

populacioni registri za neka od hroničnih masovnih nezaraznih bolesti, podaci SZO (<http://www.euro.who.int/hfadb>) za period 2012-2016.godine.

Materijal dostavljen od strane centara Instituta koji pripadaju oblasti epidemiologije i higijene deo je ove analize u izvornom obliku, izuzev minimuma tehničkih korekcija. Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Topličkog okruga bazirana je na rutinskim podacima demografske i zdravstvene statistike i predstavlja praćenje i nadzor nad stanjem zdravlja stanovništva ovog područja, za period 2012-2016. godine.

Kako bi analiza bila kvalitetnija, većina pokazatelja, je prikazana za osmogodišnji period (2009-2016.god.), kada se mogu pratiti i trendovi. Primjenjena je direktna standardizacija stopa mortaliteta prema STANDARDNOJ EVROPSKOJ POPULACIJI iz 2013.godine (<http://ec.europa.eu/eurostat/documents/>). Rad zdravstvenih ustanova je sagledan globalno jer detaljne analize radi Centar za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite.

Autor prva tri poglavlja je dr Svetlana Stević, specijalista socijalne medicine, magistar preventivne medicine, šef odseka za biostatistiku i analizu zdravstvenih pokazatelja, Centra za informatiku i biostatistiku u zdravstvu Instituta za javno zdravlje Niš.

1. Demografski i socio-ekonomski pokazatelji

1.1. Vitalno-demografske karakteristike

1.1.1. Teritorija i stanovništvo

Prema Popisu stanovništva 2011.godine, Toplički okrug/oblast je površine 2231 km². Na toj površini, u 267 naselja sa 31184 domaćinstva, živi 91754 stanovnika. Gustina naseljenosti je 41/km². Prosečno domaćinstvo broji 3 (2,9) člana, što je posledica brojnih samačkih domaćinstava (22,4%) i porodica sa jednim detetom.

Procena Republičkog zavoda za statistiku je da (30.06.2016.god.), u Topličkom okrugu/oblasti broj stanovnika iznosi 86327.

Vitalno-demografske karakteristike

- ❖ Demografski *vrlo staro* stanovništvo
- ❖ *Niska* opšta stopa fertiliteta i nataliteta
- ❖ *Visoke* opšte stope mortaliteta
- ❖ *Negativan* prirodni priraštaj
- ❖ Očekivano trajanje života sve *duže*
- ❖ *Veoma niske* stope mortaliteta odojčadi
- ❖ Vodeći uzroci smrti su *KVB, tumori i nedovoljno definisana stanja*

Tabela 1. Broj stanovnika na teritoriji Nišavskog i Topličkog okruga, 2009-2016.god.

TERITORIJA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Nišavski okrug	374017	372670	376319	374371	372220	370215	368088	366056
Toplički okrug	94570	93513	91754	90707	89574	88513	87414	86327

*Popis stanovništva 2011.god. i procene Zavoda za statistiku R. Srbije

Na teritoriji Topličkog okruga, između 2009. i 2016. godine broj stanovnika se konstantno blago smanjuje (Tabela 1), prosečno godišnje za 1030 (indeks 2016/2009=91,3%).

1.1.2. Starosna i polna struktura


Analiza bioloških karakteristika stanovništva služi za procenu prioritetnih zdravstvenih potreba. Ona je osnov za planiranje mera zdravstvene zaštite i razvoj zdravstvenih resursa. Raspodela stanovništva, prema polu i životnom dobu, slikovito se prikazuje *piramidom starosti (drvo života, arbor vitae)*. Već duže vreme, oblik piramide je izmenjen i ona sve više poprima izgled «urne» (Grafikon 1), karakterističan za demografski staro stanovništvo.

Tabela 2. Stanovništvo Topličkog okruga i Prokuplja prema starosti i polu, 2016.god.

Starost (u godinama)	Toplički okrug			Prokuplje		
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž
0	737	374	363	397	193	204
1-4	2965	1512	1453	1615	800	815
5-9	3873	2026	1847	1970	1023	947
10-14	4587	2379	2208	2239	1149	1090
15-19	4883	2531	2352	2405	1253	1152
20-24	5439	2868	2571	2728	1453	1275
25-29	5104	2761	2343	2556	1354	1202
30-34	4800	2573	2227	2405	1248	1157
35-39	5111	2687	2424	2609	1354	1255
40-44	5784	2943	2841	2855	1415	1440
45-49	5818	2998	2820	2884	1479	1405
50-54	5902	3070	2832	2826	1393	1433
55-59	5985	3089	2896	2865	1438	1427
60-64	6604	3345	3259	3187	1603	1584
65-69	6134	3022	3112	2987	1431	1556
70-74	4327	1952	2375	1960	859	1101
75-79	4124	1816	2308	1831	780	1051
80-84	2751	1101	1650	1162	459	703
85 i više	1399	529	870	587	222	365
UKUPNO	86327	43576	42751	42068	20906	21162

Izvor: Procena Zavoda za statistiku R. Srbije, baza podataka

Grafikon 1. Piramida starosti stanovništva Topličkog okruga i Prokuplja, 2016. god.



U Topličkom okrugu prisutna je pozitivna **stopa maskuliniteta** – 1019 muškaraca na hiljadu žena. Procena za 2016.godinu prikazuje samo Prokuplje kao opštinu sa poželjnim odnosom muškog i ženskog stanovništva: stopa maskuliniteta je negativna, što je indirektni pokazatelj boljeg zdravlja i socijalnog statusa ženske populacije (Tabela 3).

Tabela 3. Broj stanovnika u Topličkom okrugu prema polu i po opštinama, 2016.god.

TERITORIJA	Ukupno	Muški	Ženski	Stopa maskulininiteta
Blace	10832	5431	5401	1006
Žitorađa	15421	7951	7470	1064
Kuršumlija	18006	9288	8718	1065
Prokuplje	42068	20906	21162	988
Toplički okrug	86327	43576	42751	1019

Izvor: Procena Zavoda za statistiku R. Srbije, baza podataka

Stanovništvo Topličkog okruga/oblasti spada u kategoriju *vrlo starog* stanovništva.

Starost jedne populacije se procenjuje na osnovu više različitih parametara. Stanovništvo je *vrlo staro* ako je **zrelost stanovništava** (procentualno učešće osoba starih 65 i više godina u ukupnoj populaciji) veća od 10%. Prema podacima za period 2009-2016. godina na teritoriji Topličkog okruga bilo je prosečno 21% stanovnika ove starosne grupe, a 2016. godine 21,7% (Tabela 4).

Na teritoriji Evropske unije 2016. godine bilo je 19,2% starijih od 65 godina. Najviše u Italiji – 22%, a najmanje u Irskoj – 13,2%. Srbija sa 19% starijih od 65 godina pripada grupi zemalja sa vrlo starim stanovništvom: Finska – 20,5%, Švedska – 19,8%, Hrvatska – 19,2%, Slovenija – 18,4%. Turska je 2016.godine imala svega 8,2% stanovnika starijih od 65 godina.

Indeks starosti za Toplički okrug, u analiziranom periodu, je u konstantnom porastu i 2016.godine iznosi 148,7.

Tabela 4. Pokazatelji starenja stanovništva Topličkog okruga u periodu 2009-2016.god.

Osnovni pokazatelji starenja	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zrelost (% starijih od 65 god)	20,9	21,0	20,4	20,4	20,7	21,1	21,4	21,7
Indeks starosti	121,2	124,9	134,2	136,0	139,5	143,0	146,1	148,7
Prosečna starost	42,4	42,7	43,1	43,2	43,4	43,5	43,6	43,8

Izvor: Procena Zavoda za statistiku R. Srbije, baza podataka

Vitalni dogadjaji u Republici Srbiji 2016.

Prosečna starost preko 30 godina označava odmakao proces starenja populacije. Prema kriterijumu prosečne starosti stanovništvo Topličkog okruga/oblasti spada u *staro* stanovništvo. Prosečna starost u periodu 2009-2016. godine iznosi oko 43 godine (Tabela 4).

Tabela 5. Struktura stanovništva (%) Topličkog okruga prema Sündberg-u, 2009-2016.

STAROST (godine)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
0-14	15,9	15,6	15,3	14,5	14,3	14,2	14,2	14,1
15-49	43,3	43,2	43,1	43,1	43,1	43,0	42,9	42,8
50 i više	40,8	41,2	41,6	42,4	42,6	42,8	42,9	43,1
UKUPNO	100,0							

Prema starosti, stanovništvo Topličkog okruga pripada *regresivnom* biološkom tipu (Sündberg). Učešće mlađih od 15 godina se smanjuje sa 15,9% 2009.godine, na 14,1% - 2016. godine (Tabela 5). Osobe starosti 50 i više godina čine preko 40% ukupnog stanovništva. Prosek Evropske unije 2016.godine je 15,6% stanovništva uzrasta 0-14 godina.

1.1.3. Rađanje i obnavljanje stanovništva

Promene broja stanovnika uslovljene su fenomenima radjanja i umiranja, kao i migratornim kretanjima. Prirodno kretanje stanovništva, pored produženja životnog veka, je osnovni činilac koji utiče na formiranje starosne strukture. Na ovaj oblik kretanja stanovništva utiču nasledni i socijalno-ekonomski faktori, obolevanje, sklapanje i razvodi brakova, razvoj zdravstvene službe, kao i drugi činiovi.


Tabela 6. Stopa nataliteta i opšta stopa fertiliteta u Topličkom okrugu 2009-2016. godine

Parametri rađanja	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Broj stanovnika	94570	93513	92445	90707	89574	88513	87414	86327
Broj živorođenih	825	727	731	749	751	747	744	739
Stopa nataliteta	8,7	7,8	7,9	8,3	8,4	8,3	8,5	8,6
Broj žena 15-49 godina	19550	19288	19051	18696	18389	18117	17842	17578
Opšta stopa fertiliteta	42,2	37,7	38,4	40,1	40,8	41,2	41,7	42,0

Izvor: Vitalni dogadjaji u Republici Srbiji 2009-2016.

Toplički okrug, kao i Nišavski, predstavlja *niskonatalitetno* područje. Stopa nataliteta ispod 12‰ smatra se nepovoljnijem stopom. U periodu 2009-2016. stopa nataliteta u Topličkom okrugu varira izmedju najmanje 7,8‰ zabeležene 2010.godine i 8,7‰ što je maksimalna stopa, a registrovana je 2009.godine. Poslednje 2016.godine stopa nataliteta je skoro ista kao i pre osam godina i iznosi 8,6 promila (Tabela 6).

Grafikon 2. Kretanje stope nataliteta Topličkog okruga, 2009-2016.



Stopa nataliteta je 2015.godine u Evropskoj uniji (EU 28) iznosila 10‰, u Nemačkoj 9‰, Finskoj 10,1‰, u Austriji 9,8‰, Hrvatskoj 8,9‰, Turskoj 16,9‰, Srbiji 9,3‰. Nerazvijene zemlje pripadaju visokonatalitetnim područjima (2013.god.- Avganistan – 34,1‰, Burundi – 44,7‰, Tadžikistan - 33‰).

Niska **opšta stopa fertiliteta** (manja od 50‰) doprinosi negativnom trendu prirodnog kretanja stanovništva, ali je, istom periodu, na teritoriji Topličkog okruga u blagom porastu sa 38,4 u 2011. godini na 42 promila 2016. godine (gotovo ista kao 2009.god.) (Tabela 6)

1.1.4. Smrtnost stanovništva (mortalitet)

Opšta stopa mortaliteta preko 11% karakteriše *visok mortalitet*, a ukoliko vrednosti prelaze granicu od 15% kategoriše se kao *vrlo visoka stopa*.

Tabela 7. Opšta stopa mortaliteta u Topličkom okrugu, 2009-2016.godine


Godina	Broj umrlih	Stopa na 1000 stanovnika	SDR* ukupno	SDR* za 0-64 god.	SDR* za 65+ god.
2009	1398	14,8	1552,1	309,6	1242,4
2010	1382	14,8	1543,9	314,9	1228,9
2011	1560	16,9	1756,9	322,9	1433,9
2012	1663	18,3	1855,0	321,3	1533,6
2013	1498	16,7	1693,0	313,5	1379,5
2014	1488	16,8	1672,0	313,7	1358,3
2015	1588	18,2	1805,5	302,4	1503,0
2016	1484	17,2	1714,4	286,6	1427,7

Izvor: *Vitalni dogadjaji u Republici Srbiji 2009-2016.*

*Standardizovana stopa mortaliteta, Evropska standardna populacija iz 2013.godine:
<http://ec.europa.eu/eurostat/documents/>

Opšta stopa mortaliteta u Topličkom okrugu je viša od 15% od 2011.godine. Najviša stopa je iznosila 18,3 promila, a zabeležena je 2012.godine, dok 2016.god. iznosi 17,2/1000 stanovnika (Tabela 7).

Grafikon 3. Trend SDR mortaliteta Topličkog okruga, 2009-2016.



Standardizovana stopa mortaliteta (prema evropskoj standardnoj populaciji izmenjenoj 2013.godine) stanovništva Topličkog okruga u analiziranom osmogodišnjem periodu ima trend porasta: $y=1590,5+24,136x$ (Grafikon 3).

Očekivano trajanje života na rođenju je jedan od najboljih pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva. Evropska unija, 2014.godine : za muškarce 78,04 godina, a za žene 83,61 godina (ukupno – 80,87). Očekivano trajanje života za oba pola na rođenju je 2014. godine preko 80

godina u Španiji, Luksemburgu, Malti, Norveškoj, Švedskoj, Finskoj, Nemačkoj. Najniže u Evropi je preko 70 godina, prema dostupnim podacima. Iste godine očekivano trajanje života na rođenju u Hrvatskoj iznosi za muškarce 75 godina, a za žene – 81, Srbija 73 i 78 godina, Poljska 74 i 82. U Japanu, 2016.godine, očekivano trajanje života na rođenju je bilo 83,8 godina.

Tabela 8. Očekivano trajanje života na rođenju u Topličkom okrugu, 2009-2016. god.


Pol	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ukupno	73,94	74,11	73,62	73,48	74,24	74,24	73,97	74,3
Muško	71,13	71,64	71,83	71,12	72,02	72,18	71,45	71,9
Žensko	77,14	76,93	75,61	76,08	76,67	76,54	76,78	77,1

Izvor: Procena Zavoda za statistiku R. Srbije, baza podataka

Na teritoriji Topličkog okruga, u periodu od 2009-2016. godine, očekivano trajanje života se postepeno povećava sa 73,9 na 74,3 godine. Razlika u očekivanom trajanju života između muškaraca i žena u Topličkom okrugu je 2009.god. bila 6 godina, dok je 2016. iznosila 5 godina. Očekivano trajanje života muškaraca i žena je blago variralo, tako da 2016.godine iznosi 71,9 godina za muškarce i 77,1 za žene (Tabela 8).

Među pokazateljima zdravstvenog stanja, **mortalitet odojčadi** je najpoznatiji, široko prihvaćen i za mnoge zemlje sveta, još uvek vrlo osjetljiv indikator zdravlja, ne samo odojčadi, već i celokupne populacije. On odražava i nivo zdravlja majke, nivo antenatalne i postnatalne zaštite majke i deteta, politiku planiranja porodice, higijenske prilike i uopšte, nivo socijalno-ekonomskog razvoja društva. Pored toga, stopa smrtnosti odojčadi je koristan indikator u proceni dostupnosti, korišćenja i efektivnosti zdravstvene zaštite, a time i organizacije i kvaliteta rada zdravstvene službe.

Grafikon 4. Trend stope mortaliteta odojčadi na teritoriji Topličkog okruga u periodu 2009-2016.god.



Postoje velike razlike u visini stope mortaliteta odojčadi između bolje i slabije razvijenih područja, kao i određenih populacionih grupa različitog socijalno-ekonomskog stanja, unutar svake zemlje. Generalno se može reći da je smrtnost dece u prvoj godini života visoka u nerazvijenim zemljama, a niska u razvijenim sredinama, gde je usled boljeg životnog standarda i kontrole egzogenih noksi postala indikator, prvenstveno, perinatalne zaštite.

U periodu od 2009-2016.godine na teritoriji Topličkog okruga **stopa mortaliteta odojčadi** se menja, ali ima blago negativni trend (Grafikon 4) tako da je 2016.godine iznosila 6,8‰. Stope smrtnosti odojčadi se smatraju *niskim* ukoliko je njihova vrednost manja od 30‰, a *veoma niske stope* su ispod 18‰. Cilj SZO za evropski region do 2020.godine je da smrtnost odojčadi bude ispod 20‰, a ako je taj cilj ostvaren onda treba težiti da smrtnost bude manja od 10‰.

Stopa smrtnosti odojčadi **2014.** godine u Evropskoj uniji bila je samo 3,7‰. Još nižu stopu imale su Finska i Švedska - 2,2‰, Srbija 5,7‰, Hrvatska 5,0‰, ali je zato stopa mortaliteta odojčadi u Uzbekistanu 10,7‰, Kazahstanu 9,8‰, Moldaviji 9,6‰. Čak i u ovim zemljama stopa mortaliteta odojčadi je manja od 18‰, što govori o napretku u zdravstvenoj zaštiti najmladjih.

Struktura umiranja odojčadi prema starosti je najbolji pokazatelj intenziteta i frekfentnosti dejstava egzogenih i endogenih faktora kao uzroka smrti. U okviru mortaliteta odojčadi posebno se prate:

- ***neonatalna smrtnost*** (smrtnost odojčadi u periodu od rođenja do 28 dana života), koja se analizira kroz dva vremenska perioda: *rana neonatalna smrtnost* (od 0-6 dana) i *kasna neonatalna smrtnost* (od 7-27 dana života);
- ***postneonatalna smrtnost*** ili mortalitet dece od navršenih 28 dana života do kraja prve godine;

Tabela 9. Stopa mortaliteta odojčadi Topličkog okruga, 2009-2016.god.

PARAMETRI	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Broj ukupno rođene dece	828	732	738	753	757	756	750	746
Broj živorodjenih	825	727	731	749	751	747	744	739
Broj mrtvorodjenih	3	5	7	4	6	9	6	7
Stopa mortinataliteta	3,5	6,8	9,5	5,3	7,9	12,0	8,0	9,4
Broj umrle odojčadi	6	4	7	6	6	8	4	5
Stopa mortaliteta odojčadi	7,3	5,5	9,6	8,0	8,0	10,7	5,4	6,8
Broj umrle odojčadi 0-6 dana	4	3	5	4	4	4	4	4
Perinatalna smrtnost	7	8	12	8	10	13	10	11
Stopa perinatalnog mortaliteta	8,2	10,9	16,3	10,6	13,2	17,2	13,3	14,7
Stopa ranog neonatalnog mortaliteta	4,8	4,1	6,8	5,3	5,3	5,4	5,4	5,4

Izvor: *Vitalni dogadjaji u Republici Srbiji 2009-2016.*

Stopa ranog neonatalnog mortaliteta je približno ista poslednjih osam godina, nešto oko 5‰. U 2016.godini 80% odojčadi je umrlo u prvoj nedelji života (Tabela 9).

Stopa rane neonatalne smrtnosti u Evropskom regionu 2014. bila je 3,2‰, a u Evropskoj uniji – 1,8‰. Razvijene zemlje (Finska,Norveška, Švedska, Nemačka, Austrija) imaju niske stope

(manje od 2%). Najviše stope u Evropi 2014 imale su sledeće države: Kirgistan –14%, Tadžikistan – 8,2%, Turkmenistan – 7,2%.

Na rani neonatalni mortalitet deluju, skoro isključivo, endogeni faktori, nedonešenost i povrede pri porođaju, dok su česti uzroci umiranja odojčadi u postneonatalnom periodu faktori spoljne sredine. Na njih se može značajnije uticati putem unapredjenja kvaliteta zdravstvene zaštite, preventivne podjednako kao i kurativne.

Stopa mortinataliteta ili mrtvorodenosti je indeks kasne fetalne smrti (posle 28 nedelja trudnoće) i predstavlja broj mrtvorodjenih na 1000 ukupno rođene dece. Na visinu stope mortinataliteta utiču brojni faktori: nepovoljna telesna građa majke, pol deteta (više je mrtvorodene muške dece), pušenje majke, određene bolesti, trovanje teškim metalima, kao i efikasnost kontrole toka trudnoće i obuhvat stručnom pomoći pri porođaju.

Stopa mortinataliteta, u periodu od 2009. do 2016.godine, pokazuje varijacije, ali ima tendenciju porasta i 2016.godine iznosi 9,4%. Ovaj proces se može dovesti u vezu sa „igrom malih brojeva“ : broj mrtvorodjene dece se kretao izmedju 3 i 9. Stopa se uočljivo menja, ako se smrtnost promeni za samo jedan (Tabela 9).


Perinatalni mortalitet odojčadi podrazumeva mrtvorodenost i ranu neonatalnu smrtnost. Izražava se stopom na 1000 ukupno rođene dece u toku godine (živorodene i mrtvorodene). Ova stopa za period 2009-2016.godine u Topličkom okrugu prosečno iznosi 13%.

U 2014. godini stopa perinatalnog mortaliteta odojčadi u Srbiji bila je 8,76%, u Finskoj – 3,97%, Nemačkoj 5,45%, Švedskoj 5,14%, Sloveniji – 5,13%, Hrvatskoj – 6,85% u Evropskoj uniji – 6,68%, a sa druge strane u Kirgistanu -23,36%.

Razvoj naučnih saznanja u oblasti medicine koja su dovela do unapređenja prevencije, dijagnostike i lečenja, produženje životnog veka, bolji socijalno-ekonomski uslovi i razvoj zdravstvene delatnosti, doveli su do značajnih promena u **strukturi mortaliteta**. Promene se ogledaju u smanjenju učešća zaraznih bolesti i većem udelu hroničnih masovnih nezaraznih oboljenja. Ovde treba naglasiti da je obolevanje, a posledično i smrtnost od AIDS-a u porastu. Takođe, novootkrivena respiratorna zarazna oboljenja sa visokom stopom letaliteta, kao i druga slična zarazna oboljenja treba da budu, svakako, užiži interesovanja zdravstvene delatnosti. Za sada, ove bolesti nisu uzele značajnog udela u ukupnoj smrtnosti.

Vodeći uzrok smrti stanovništva Topličkog okruga u periodu od 2009. do 2016. godine jesu *bolesti sistema krvotoka* (I00-I99). Ova grupa oboljenja čini oko polovine umrlih. Na drugom mestu su *tumori* od kojih je umrla svaka šesta ili sedma osoba – učešće 15-17% (Grafikon 5). Treće mesto pripada nedefinisanim uzrocima smrti, odnosno grupi – *simptomi, znaci i nenormalni klinički i laboratorijski nalazi*, koja pokazuje postepeni porast i u osmogodišnjem periodu njihovo učešće se gotovo udvostručilo, tako da 2016.godine iznosi 12,2% (Tabela 10). Ovakav trend nedovoljno jasnih uzroka smrti je nepovoljan indikator zdravstvenog stanja stanovništva Topličkog okruga, ali i rada zdravstvene službe.

Grafikon 5. Najčešće grupe bolesti kao uzroci smrti na području Topličkog okruga 2016.god.



Na području Topličkog okruga najviše su **specifične stope mortaliteta** od *kardiovaskularnih oboljenja*. U 2016.godini stopa je bila 831,7/100000 stanovnika i viša je nego u C. Srbiji, Vojvodini i na teritoriji Nišavskog okruga. U populaciji preko 65 godina starosti stopa je višestruko veća, nego medju mlađima (Tabela 11).

Tabela 11 Specifične stope mortaliteta prema vodećim uzrocima smrti i starosti u Republici Srbiji 2016.godine

Teritorija	KVB (I00-I99)			Tumori (C00- D48)			Grupa (R00-R99)		
	Ukupno	<65god.	65+god.	Ukupno	<65god.	65+god.	Ukupno	<65god.	65+god.
C. Srbija	740,2	100,2	3383,6	300,8	129,1	1010,0	77,7	22,2	306,7
Vojvodina	732,5	121,8	3463,5	339,5	152,5	1176,1	51,2	20,9	186,4
Nišavski okrug	678,6	84,3	2922,8	312,2	119,9	1038,6	139,6	35,6	532,4
Toplički okrug	831,7	109,5	3437,4	286,1	119,8	886,0	209,7	23,7	880,7
Sokobanja	1389,4	160,3	4533,4	318,5	132,0	795,8	115,2	47,1	289,4

*Izvor: Baza podataka Zavoda za statistiku R. Srbije

Stopa umiranja od *malignih oboljenja* je 286,1 na 100.000 stanovnika u Topličkom okrugu i manja je od iste u Vojvodini, C. Srbiji i Nišavskom okrugu 2016.godine. Za razliku od tumora, grupa nedovoljno definisanih oboljenja i stanja je 2016.godine, na teritoriji Topličkog okruga iznosila 209,7/100000 stanovnika i bila viša nego na području Nišavskog okruga, Vojvodine, C.Srbije i opštine Sokobanja.

Standardizovane stope mortaliteta ukupno, za kardiovaskularne i maligne bolesti na analiziranim područjima i u izabranim evropskim zemljama prikazane su u tabeli 12.


Ukupna standardizovana stopa mortaliteta u 2016.godini je 1514,5/100000 stanovnika C. Srbije i 1657,3/100000 stanovnika Vojvodine. Na teritoriji Topličkog okruga, iste godine, stopa je nešto viša - 1714,3/100000 stanovnika.

Standardizovana stopa mortaliteta od **kardiovaskularnih oboljenja** iznosila je 858,5 na 100.000 stanovnika za područje Topličkog okruga. U poređenju sa Evropskom unijom (192/100000) stope su višestruko više, ali slične onima u Vojvodini, a manje nego u Sokobanji.

Tabela 12 Standardizovane stope mortaliteta prema vodećim uzrocima smrti i starosti u R. Srbiji 2016.godine (i izabranim evropskim državama 2014.god.*)


Teritorija	KVB (I00-I99)			Tumori (C00- D48)			Grupa (R00-R99)		
	Ukupno	<65god.	65+god.	Ukupno	<65god.	65+god.	Ukupno	<65god.	65+god.
C. Srbija	819,4	70,3	749,1	292,9	91,8	201,1	84,9	16,4	68,5
Vojvodina	890,7	85,7	805,0	344,1	108,6	235,5	59,2	15,5	43,7
Nišavski okrug	713,8	59,2	654,5	294,7	84,6	210,1	151,9	25,7	126,2
Toplički okrug	858,5	77,9	780,7	261,9	86,5	175,3	236,5	16,20	220,3
Sokobanja	1064,6	93,2	971,4	236,1	78,0	158,0	102,2	35,7	66,5
Evropska unija*	192,0	38,0	1420,8	161,7	66,4	930,8	22,5	9,4	126,1
Srbija*	448,8	83,5	3404,4	198,5	101,7	982,4	43,8	17,6	256,2
Hrvatska*	314,0	55,4	2406,6	208,3	89,2	1171,7	5,8	1,6	40,1
Austrija*	187,5	25,7	1496,6	150,9	59,8	888,0	14,7	6,0	84,7
Nemačka*	186,3	31,8	1436,3	153,6	60,6	905,9	19,1	10,3	90,0
Finska*	181,8	35,8	1363,0	129,4	44,2	818,8	8,9	5,7	34,9
Švedska*	159,0	23,9	1251,6	136,6	45,1	877,0	15,5	4,5	104,6
Rumunija*	448,9	87,1	3376,2	176,0	90,7	866,2	14,3	11,9	34,3
Madjarska*	380,5	88,8	2740,8	229,9	117,0	1143,3	1,3	0,7	6,1

Graffikon 6. SDR vodećih uzroka smrti u R. Srbiji 2016.godine (i izabranim evropskim državama 2014.god.)



Mortalitet od malignih bolesti je čak tri puta manji na teritoriji Topličkog okruga, u odnosu na bolesti cirkulatornog sistema. Standardizovana stopa umiranja od **malignih oboljenja** na teritoriji Topličkog okruga (261,9/100000 stanovnika) je viša nego u svim evropskim zemljama prikazanim u Tabeli 12. Standardizovana stopa mortaliteta za grupu **R00-R99** je deset puta viša od proseka Evropske unije i 2016.godine iznosi 236,5/100000 stanovnika.

Grafikon 7. SDR grupe R00-R99 (MKB-X) u R. Srbiji 2016.godine i nekim evropskim državama (2014.god.*)



Standardizovane stope mortaliteta **starijih od 65 godina** su mnogostruko veće. U 2016.godini na teritoriji Topličkog okruga, na 100.000 stanovnika **mladjih od 65 godina** umrle su 74 osobe od bolesti kardiovaskularnog sistema, 81 od tumora i 16 usled nedovoljno jasnih uzroka (Tabela 12). Iste godine standardizovana stopa mortaliteta u populaciji starijih od 65 godina bila je 781/100000 za bolesti cirkulatornog sistema, 175 za maligna oboljenja i 220/100000 stanovnika za grupu nedovoljno jasnih uzroka smrti.

1.1.5. Prirodni priraštaj

Dinamiku stanovništva pratimo, prvenstveno kroz kretanje prirodnog priraštaja, kao rezultante delovanja nataliteta i mortaliteta.


Tabela 13. Prirodni priraštaj u Topličkom okrugu, 2009-2016.godine

Godina	Broj živorođenih	Broj umrlih	Razlika (n)	Stopa
2009	825	1398	-573	-6,1
2010	727	1382	-655	-7,0
2011	731	1560	-829	-9,0
2012	749	1663	-914	-10,1
2013	751	1498	-747	-8,3
2014	747	1488	-741	-8,4
2015	744	1588	-844	-9,7
2016	739	1484	-745	-8,6

Izvor: Vitalni dogadjaji u Republici Srbiji 2009-2016.

U Topličkom okrugu je stopa prirodnog priraštaja negativna već desetak godina (Tabela 13).

Grafikon 8. Kretanje prirodnog priraštaja na teritoriji Topličkog okruga, 2009-2016.



U ovom periodu (2009-2016. godine) najviša stopa je bila je 2012. godine -10,1% (Grafikon 8), a najniža 2013. godine i iznosila je -8,3%. U 2016.godini, na području Topličkog okruga umrlo je 745 osoba više nego što se rodilo dece, tako da stopa prirodnog priraštaja iznosi -8,6%.

1.1.6. Skopljeni i razvedeni brakovi

Reprodukcijska stanovništva se, većinom, obavlja kroz instituciju braka. U Republici Srbiji 70-80% živorođene dece rađa se u bračnoj zajednici. Zbog toga visina stope nataliteta, u određenoj meri, zavisi od broja skopljenih brakova, odnosno od stepena bračnosti stanovništva. U Institutu za javno zdravlje Niš prikupljaju se podaci o porođajima na području Nišavskog i Topličkog okruga.

U osmogodišnjem periodu od 2009-2016. godine **stopa nupcijaliteta** (broj skopljenih brakova na 1000 stanovnika) u Topličkom okrugu kretala se oko 2,9 do 4,6%, prosečno 3,8/1000 stanovnika. Stopa sklapanja brakova varira ali, posmatrano u dužem vremenskom periodu, ona je u blagom porastu (Tabela 14). Pri sklapanju braka, 2016.godine u Srbiji, oba supružnika su bila, u proseku, starija od 30 godina (muškarac- 34, a žena 30,6 godina), što je još jedan nepovoljni pokazatelj kada se radi o reprodukciji.

Tabela 14. Stopa sklapanja i razvoda brakova u Topličkom okrugu, 2009-2016.godine

Sklapanje i razvodi brakova		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sklopljeni brakovi	Broj	274	302	363	322	367	366	409	373
	Stopa/1000 st.	2,9	3,2	4,0	3,5	4,1	4,2	4,6	4,3
Razvedeni brakovi	Broj	47	62	1	126	79	103	55	99
	Stopa/1000 st.	0,5	0,66	0,0	1,4	0,9	1,2	0,6	1,1
Stopa/1000 skopljenih brakova		171,5	205,3	2,8	391,3	215,2	281,4	134,5	265,4

Izvor: *Zaključeni i razvedeni brakovi u Republici Srbiji 2009-2016.god.*

Stopa divorcijaliteta (broj razvoda na 1000 venčanja) u Republici Srbiji u 2016. godini iznosi 252 (svaki četvrti brak je razveden). Na teritoriji Topličkog okruga ova stopa pokazuje manje ili veće varijacije, ali je nešto veća nego u Srbiji i 2016.godine iznosi 265,4/1000 sklopljenih brakova (Tabela 14).

Potretno je istaći da postoji neredovno dostavljanje podataka o razvodima iz sudova, čija je to obaveza.

1.2. Socijalno-ekonomski pokazatelji

Stopa zaposlenosti u Topličkom okrugu se blago povećava u periodu od 2009-2016. godine. Ukupan broj zaposlenih na području Topličkog okruga 2016.godine iznosi 217/1000 stanovnika, ili 31,1% u populaciji starosti 20-64 godine. U ovom periodu svaki peti radnik je radio kod privatnog preduzetnika (Tabela 15).

Tabela 15. Zaposlenost na teritoriji Topličkog okruga, 2009-2016.godine

Parametri	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Broj zaposlenih*	15374	14000	13924	15329	15727	16012	18097	18747
Stopa/1000 stanovnika	163,0	146,0	151,0	167,1	176,0	181,0	207,0	217,2
% zapolesnih kod privatnih preduzetnika	30,5	27,4	22,1	20,8	22,7	24,8	19,5	19,4

Izvor: *Opštine i regioni u Republici Srbiji 2010-2016.god.*

*Registrovana zaposlenost u Republici Srbiji, 2016. (saopštenje)

Stopa zaposlenosti u EU-28 za osobe starosti 20 do 64 godina, koja je merena istraživanjem radne snage EU u 2016. godini, iznosila je 71,1%, što je najveći godišnji prosek zabeležen za EU. Iza ovog proseka se ipak mogu naći velike razlike između zemalja. Jedina država članica sa stopom iznad 80% je Švedska (81,2%). To je slučaj i sa Islandom (87,8%) i Švajcarskom - 83,3%. (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics)

Stopa nezaposlenosti, na području Topličkog okruga, se povećava do 2014.godine a zatima se minimalno smanjuje (Tabela 16). Stopa nezaposlenosti je u 2009.godini iznosila 162/1000 stanovnika, a 2016. godine 172 promila (prosečno 170%). U odnosu na Beogradsku oblast (62/1000 stanovnika) stopa nezaposlenosti je gots tri puta veća.

Tabela 16. Nezaposlenost na teritoriji Topličkog okruga, 2009-2016.godine

Parametri	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Broj nezaposlenih	15280	14264	15497	15987	15809	15739	15173	14811
% bez kvalifikacija	40,6	40,5	41,7	41,0	40,4	38,7	38,1	38,6
% žena	49,3	49,5	48,7	47,4	47,7	47,6	47,7	48,3
Stopa nezaposlenih na 1000 stanovnika	162,0	153,0	168,0	176,0	176,0	178,0	174,0	172,0

Procentualno učešće žena u ukupnom broju nezaposlenih kreće se oko 50%, osoba bez kvalifikacija oko 40% sa trendom laganog smanjenja (Tabela 16).

Naša zemlja je u vrhu liste evropskih zemalja prema stopi nezaposlenosti. Prema podacima Eurostata, u EU stopa nezaposlenosti u januaru 2014.godine je bila 10,8%, dakle u evrozoni bez posla je 26,23 miliona ljudi. Najviše nezaposlenih je u Grčkoj (28%) i Španiji (25,8%), dok nešto

nižu stopu beleže Austrija (4,9%), Nemačka (5%)/ i Luksemburg (6,1%).

Najnižu stopu nezaposlenosti u Evropi ima Andora u kojoj se nalazi 2,9% nezaposlenih, San Marino sa 3,1%, Švajcarska i Norveška sa 3,4%. Stopa nezaposlenosti u Srbiji iznosi 28,9%.

Tabela 17. Prosečne mesečne zarade (RSD) po zaposlenom na području Topličkog okruga u periodu 2009-2016. godine

Parametri	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zarada	23689	23689	26999	29701	32624	45313	33569	47436
Indeks u odnosu na R. Srbiju	68,8	69,4	71,1	78,2	74,3	74,0	75,5	74,7
Indeks u odnosu na Beograd	55,8	55,8	57,5	63,2	60,3	59,2	60,4	59,9

Prosečna mesečna zarada po zaposlenom, na teritoriji Topličkog okruga, u periodu od 2009-2016. godine varira, ali je u blagom porastu sa 23689 na 47436 dinara. U ovom periodu indeks u odnosu R. Srbiju (63474 RSD) se kretao od 74-78%. U odnosu na Beograd (79242 RSD) zarade su manje za približno 40% (Tabela 17). Zarada u Prokuplju 2016.godine (47102 RSD) je nešto niža u odnosu na Toplički okrug.

2. Obolovanje stanovništva (morbidity)

Indikatori oboljevanje su grupa klasičnih pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva. U našoj zemlji, zvanično registrovani morbiditet, čine podaci o broju i vrsti oboljenja, osnovnim demografskim karakteristikama osobe, dužini lečenja, vrsti terapije i ishodu, ali samo onog dela stanovništva koje se obrati zdravstvenoj ustanovi radi pružanja usluga.

2.1. Vanbolnički morbiditet

Podaci o morbiditetu registrovanom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti rezultat su rutinske zdravstvene statistike: beleže se samo ona stanja koja su pacijenta, zbog subjektivnih smetnji, navela da zatraži pomoć zdravstvenih radnika. Veći broj evidentiranih dijagnoza ne mora, obavezno, da znači veći broj bolesnih u populaciji, već može biti posledica i učestalijeg korišćenja zdravstvene službe.

2.1.1. Služba opšte medicine

- ❖ Vodeće grupe oboljenja u službi opšte medicine su *respiratorne i kardiovaskularne bolesti*
- ❖ Najčešće dijagnoze su *povišen krvni pritisak i akutna upala ždrela*

U službama opšte medicine na području **Topličkog okruga** u periodu 2009-2016. godine ukupan broj oboljenja je varirao, tako da godišnji prosek iznosi 84.804 (indeks 2016/2009=136,6%). Ukupna stopa vanbolničkog morbiditeta službi opšte medicine na teritoriji Topličkog okruga 2016.godine iznosila je 1834/1000 korisnika.

Najzastupljenija grupa bolesti su **bolesti sistema za disanje** (oko 20%). Stopa morbiditeta je u 2016.godini iznosila 358/1000 i viša je u odnosu na prethodnu godinu. Više od trećine dijagnoza ove grupe (45%) su *akutno zapaljenje ždrela i krajnika* (Tabela 18 i 19).

Na drugom mestu po učestalosti su **kardiovaskularna oboljenja**. Prosečno godišnje je evidentirano 17.402 obolelih od kardiovaskularnih bolesti (indeks 2016/209=150,1%). Među njima dominira *povišen krvni pritisak* koji čini oko 66% svih bolesti sistema krvotoka 2016.godine.

Tokom analiziranog perioda treće mesto po učestalosti pripada **bolestima mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva**, izuzev 2015.god. kada se tu našla grupa **faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom**. Bolesti mišićno-koštanog sistema čine 10-15% ukupnog morbiditeta ove službe. Slede **bolesti mokraćno-polnog sistema**. Udeo ovih bolesti u ukupnom morbiditetu iznosio je 5-7%. Poslednje, 2016.godine medju prvih pet grupa bolesti, u strukturi morbiditeta službi opšte medicine, našla se i grupa bolesti **duševni poremećaji i poremećaji ponašanja**.

U 2016.god. na teritoriji **Topličkog okruga** vodećih pet dijagnoza čine 36,5% svih oboljenja evidentiranih u ovoj službi (Tabela 19). Najzastupljenije dijagnoze su: *povišeni krvni pritisak* (17%), *akutno zapaljenje ždrela i krajnika* (9%) i *druga oboljenja ledja* (6%). *Neurotski, stresogeni i somatoformni poremećaji*, kao i *druge ishemiske bolesti srca* čine po 3% registrovanih oboljenja u službi opšte medicine Topličkog okruga.

2.1.2. Služba za zdravstvenu zaštitu radnika (medicina rada)

- ❖ Vodeće grupe oboljenja u službi medicine rada su *respiratorne i kardiovaskularne bolesti*
- ❖ Najčešće dijagnoze su *akutna upala ždrela i povišen krvni pritisak*

U službama za zaštitu radnika na području **Topličkog okruga**, u periodu 2009-2016. godine, evidentirano je ukupno 211.605 oboljenja, stanja i povreda ili 26.451 u proseku godišnje. Broj registrovanih dijagnoza se u osmogodišnjem periodu smanjio za 34% (indeks 2016/2009=65,9%).

Najzastupljenija grupa bolesti jesu **bolesti sistema za disanje**. Udeo ovih bolesti u ukupnom morbiditetu je po 30-35% (Tabela 20). *Akutno zapaljenje ždrela i krajnika* je najčešća dijagnoza u ovoj grupi bolesti i u 2016. iznosi 63%.

Drugo mesto pripada **bolestima sistema krvotoka**. Udeo ovih bolesti u ukupom morbiditeu se kretao od 11,1% u 2011.godini do 28,7 % u 2016.godini. *Arterijska hipertenzija* je vodeća dijagnoza u ovoj grupi bolesti (66%) i učestvuje u ukupnom morbiditetu službe sa 19% (2016.god.).

Na trećem, četvrtom i petom mestu po učestalosti iz godine u godinu menja se redosled grupa bolesti (Tabela 20). Na trećem mestu su **faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom** čije je učešće u morbiditetu službe za zdravstvenu zaštitu radnika 2015.godine bilo 11%, a 2016. god. 20%.

U analiziranom periodu **bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva** čine 6-12% ukupnog morbiditeta i obaveznos u medju prvih pet grupa oboljenja.

Poslednje godine grupa **simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi** zauzima peto mesto, kao i u periodu izmedju 2011. i 2014.godine.

U službi za zdravstvenu zaštitu radnika na teritoriji **Topličkog okruga** 2016.godine prvih pet dijagnoza, čine 64,2% svih evidentiranih oboljenja (Tabela 21). Najzastupljenije dijagnoze su: *akutno zapaljenje ždrela i krajnika* (20%), *arterijska hipertenzija* (19%), *lica u zdravstvenim službama iz drugih razloga* (13%), *lica u zdravstvenim službama radi pregleda i ispitivanja* (7%), *zapaljenje dušnica, emfizem i druge opstruktivne bolesti pluća* (5%).

2.1.3. Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece

- ❖ Prosečno 7 dijagnoza po detetu 2016.god.
- ❖ Dominiraju *respiratorna oboljenja*

Broj utvrđenih oboljenja, stanja i povreda u službama za zdravstvenu zaštitu predškolske dece na području **Topličkog okruga** u periodu 2009.-2016.godine je 293.177 (indeks 2016/2009=96,4%). Prosečno godišnje registrirano je 36.647 dijagnoza, a stopa obolevanja 2016.godine iznosi 7312/1000 dece predškolskog uzrasta.

U ovoj populaciji dominiraju **respiratorna oboljenja**. Svako drugo dete koje se obratilo lekaru ove službe imalo je neku bolest disajnih organa. Učešće u ukupnom morbiditetu službe se kretalo između 55% i 75% (Tabela 22). Stopa morbiditeta 2016.god. iznosi 4042 %.

Sledi grupa faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom. Udeo ovih bolesti tokom osmogodišnjeg perioda je, u proseku, 12,2%. Ovoj grupi pripadaju i preventivne posete službi za zdravstvenu zaštitu dece predškolskog uzrasta.

Od trećeg do petog mesta su različite grupe bolesti, pojedinih godina i to su: **bolesti sistema za varenje, zarazne bolesti, bolesti kože i potkožnog tkiva i simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi** (Tabela 22).

Četiri od pet najučestalijih dijagnoza pripadaju grupi respiratornih oboljenja. Prve četiri su: *akutno zapaljenje ždrela i krajnika, akutne infekcije gornjih respiratornih puteva, akutni bronhitis i bronhiolitis, akutno laringitis i traheitis*, i peta dijagnoza: *lica koja traže zdravstvene usluge radi pregleda i ispitivanja ili ostala lica potencijalno ugrožena zaraznom bolešću* (Tabela 23). Prvih pet dijagnoza u službi za zdravstvenu zaštitu predškolske dece na teritoriji **Topličkog okruga** 2016.godine činile su 61% ukupnog morbiditeta.

2.1.4. Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine

- ❖ Dve do četiri od pet nazastupljenijih dijagnoza pripadaju *respiratornim oboljenjima*
- ❖ Prosečan broj dijagnoza po detetu školskog uzrasta je 3-4

Broj utvrđenih oboljenja, stanja i povreda u službama za zdravstvenu zaštitu školske dece na području **Topličkog okruga** u periodu od 2009-2016. god. je varirao i iznosi prosečno godišnje 37.519 i za 13,5% je manji 2016.god. u odnosu na 2009.godinu (indeks 2016/2009=86,5%). Stopa oboljevanja 2016.godine iznosila je 3572‰ (prosečno 3-4 dijagnoze po detetu školskog uzrasta).

Najučestalija su, kao i obično, **respiratorna oboljenja**. Udeo ovih bolesti u ukupnom morbiditetu bio je oko 60% (Tabela 24). Stopa oboljevanja iznosila je 1949‰ u 2016.godini. Najčešća dijagnoza iz ove grupe su bile *akutno zapaljenje ždrela i krajnika*.

Na drugom i trećem mestu su **faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom** (udeo u ukupnom morbiditetu je 2016.godine 14,7%) i **bolesti sistema za varenje** (udeo 3,4-7,3%).

Od trećeg do petog mesta su različite grupe bolesti, pojedinih godina i to su: **bolesti sistema za varenje, zarazne bolesti, bolesti kože i potkožnog tkiva i simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi** (Tabela 24).

Ono što je nepovoljan pokazatelj jeste da se poslednje dve godine analiziranog perioda, medju prvih pet grupa bolesti pojavila i dijagnostička kategorija **simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi** sa učešćem u ukupnom morbiditetu službe, 2016.godine, od 5,5%.

U službama za zdravstvenu zaštitu dece školskog uzrasta na teritoriji **Topličkog okruga** 2016. godine prvih pet vodećih dijagnoza čine 61% registrovanog morbiditeta. Među njima su tri dijagnoze iz grupe respiratornih oboljenja. Dijagnoza *akutno zapaljenje ždrela i krajnika* se nalazi na prvom mestu. Slede *akutne infekcije gornjih respiratornih puteva i akutni laringitis i traheitis*.

Tokom somogodišnjeg perioda u prvih pet dijagnoza ove službe našle su se i sledeće dijagnostičke kategorije: *lica koja traže zdravstvene usluge radi pregleda i ispitivanja, ostala lica potencijalno zdravstveno ugrožena zaraznom bolešću, druge bolesti jednjaka, želuca i dvnaestopalačnog creva* (Tabela 25).

2.1.5. Služba za zdravstvenu zaštitu žena

- ❖ *Bolesti mokraćno-polnog sistema* su najzastupljenije i čine oko 70% ukupnog morbiditeta ove službe
- ❖ Najčešće pojedinačne dijagnoze su *druga zapaljenja karličnih organa i poremećaji menstruacije*

U službi za zdravstvenu zaštitu žena na teritoriji **Topličkog okruga** u periodu 2009-2016. godine broj registrovanih oboljenja, stanja i povreda je iznosio ukupno 80.786 ili prosečno 10.098 godišnje. Smanjio se broj evidentiranih dijagnoza za 20,2% (indeks 2016/2009=79,8%). Stopa morbiditeta u 2016.godini iznosi 253,7/1000 žena starijih od 15 godina.

U službi za zdravstvenu zaštitu žena najčešće su prisutne **bolesti mokraćno-polnog sistema** (Tabela 26). Ova oboljenja čine 75,7% registrovanog morbiditeta 2016.godine. Učestalost ovih bolesti u 2016.godini je 179‰.

Na drugom mestu je grupa bolesti **faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom** čiji je udeo u ukupnom morbiditetu konstantno 2016.godine bio 16,8%. U ovu grupu spadaju različite vrste preventivnih pregleda koji se obavljaju u službi za zdravstvenu zaštitu žena. Navedene dve grupe dijagnoza čine više od 90% registrovanog morbiditeta u službi za zdravstvenu zaštitu žena u periodu od 2009-2016.godine.

Mnogo manja je zastupljenost **tumora** i stanja koja pripadaju grupi **trudnoća, radjanje i babinje** (Tabela 26). Ono što je nepovoljan pokazatelj jeste da se poslednje dve godine medju prvih pet grupa bolesti pojavila i dijagnostička kategorija **simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi** sa učešćem u ukupnom morbiditetu službe oko 1%.

Na teritoriji **Topličkog okruga** su posete službama za zdravstvenu zaštitu žena u 2016. godini najčešće ostvarivane pod dijagnozom: *druga zapaljenja ženskih karličnih organa* (18,7%), *cervicitis uteri* (16,5%) *poremećaji menstruacije* (13,8%), *bolesti dojke* (8,3%) i *preporodajni pregledi i druge kontrole trudnoće* (7,9%). Prvih pet dijagnoza čine gotovo dve trećine (65,2%) registrovanih oboljenja i stanja u službi zdravstvene zaštite žena (Tabela 27).

2.1.6. Služba za zaštitu i lečenje bolesti usta i zuba

Na području Topličkog okruga u periodu 2009-2016.godine u stomatološkoj službi evidentirano je ukupno 283.176 oboljenja i stanja, ili prosečno godišnje 35.397. Stopa oboljevanja je 2016.godine iznosila 340/1000 stanovnika.

Najčešća oboljenja registrovana u ovoj službi su: *druge bolesti zuba i potpornih struktura* (60-67%), a sledi *zubni karijes* (oko 30%) i *druge bolesti usne duplje, pljuvačnih žlezda i vilica* (Tabela 28).

Tabela 28. Morbiditet u stomatološkim službama Topličkog okruga, 2009-2016. god.

Dijagnoze prema MKB-X	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zubni karijes (K02)	N %	12778 35,0	14183 36,2	11290 32,7	11667 32,7	11451 30,4	10662 30,3	10498 29,9
Druge bolesti zuba i potpornih struktura (K00-K01, K03-K08)	N %	21017 57,6	23562 60,1	21951 63,5	21504 60,4	24166 64,0	22455 64,0	23403 66,7
Druge bolesti usne duplje, pljuvačnih žlezda i vilica (K09-K14)	N %	2682 7,4	1469 3,7	1331 3,8	2460 6,9	2130 5,6	2009 5,7	1176 3,4
UKUPNO	N %	36477 100,0	39214 100,0	34572 100,0	35631 100,0	37747 100,0	35126 100,0	35077 100,0

Struktura obolevanja u stomatološkoj službi na teritoriji Topličkog okruga, u odnosu na uzrast 2016.godine, prikazana je u Tabeli 29.

Tabela 29. Morbiditet evidentiran u stomatološkoj službi Topličkog okruga 2016. god.

Grupa bolesti prema MKB-X	Predškolski		Školski		Ostali	
	N	%	N	%	N	%
Zubni karijes (K02)	763	32,8	3672	30,1	3735	25,2
Druge bolesti zuba i potpornih struktura (K00-K01, K03-K08)	1407	60,5	7869	64,4	10532	71,2
Druge bolesti usne duplje, pljuvačnih žlezda i vilica (K09-K14)	155	6,7	667	5,5	532	3,6
UKUPNO	2325	100,0	12208	100,0	14799	100,0

Stopa morbiditeta za *zubni karijes* 2016.godine iznosi 95/1000 stanovnika Topličkog okruga.

U grupi dece predškolskog uzrasta stopa je viša nego u ukupnoj populaciji i iznosi 145%, 2016.godine. Medju školskom decom evidentirano je 12.208 stomatoloških oboljenja, tako da je stopa morbiditeta 1129%. Stopa obolevanja od zubnog karijesa je najviša u populaciji školske dece i 2016.godine je bila 340%. Ovo je, najverovatnije, posledica besplatnog lečenja zuba dece ovog uzrasta u okviru primarne zdravstvene zaštite.

2.2. Bolnički morbiditet i mortalitet

U toku 2016. godine stanovništvo Topličkog okruga je ostvarilo 16.472 epizode bolničkog lečenja u stacionarnim zdravstvenim ustanovama Nišavskog i Topličkog okruga, kao i u Sokobanji. Stopa hospitalizacije je 190,8% (visoka stopa). Od ukupnog broja hospitalizacija većinu su ostvarile žene 8.811 - 52,6% hospitalizacija, a stopa hospitalizacije žena iznosi 206/1000). Stanovništvo muškog pola je u 2016.godini ostvarilo 7.661 epizoda bolničkog lečenja (46,5%) tako da je stopa hospitalizacije muškaraca 175,8%. Tokom 2016.godine ukupan broj hospitalizovanih osoba bio je 10.346: 4.694 muškaraca (45,4%) i 5.652 žena (54,6%). Iste godine je, prosečno, svaka osoba bila stacionarno lečena više nego jednom – 1,6 puta.

Ukupan broj fatalnih ishoda stacionarno lečenih stanovnika Topličkog okruga u 2016.godini je 168, a broj hospitalizovanih osoba 10.346, tako da je opšta stopa bolničkog mortaliteta 1,6%. Ukupan broj muškaraca, umrlih tokom hospitalizacije i lečenja je 90 (53,6%), a žena 78 (46,4%). Više od 3/4 umrlih činile su osobe starije od 65 godina (133 ili 79,2%).

Tabela 30. Struktura bolničkog morbiditeta i stopa hospitalizacije stanovništva Topličkog okruga 2016.god

Grupe bolesti prema MKB-X	Broj	%	Stopa
Zarazne i parazitarne bolesti (A00-B99)	544	3,3	6,3
Tumori (C00-D48)	1778	10,8	20,6
Bolesti krvi, krvotvornih organa i poremećaji imuniteta (D50-D89)	358	2,2	4,1
Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma (E00-E90)	540	3,3	6,3
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (F00-F99)	379	2,3	4,4
Bolesti nervnog sistema (G00-G99)	557	3,4	6,5
Bolesti oka i pripojaka oka (H00-H59)	491	3,0	5,7
Bolesti uva i bolesti mastoidnog nastavka (H60-H95)	77	0,5	0,9
Bolesti sistema krvotoka (I00-I99)	2043	12,4	23,7
Bolesti sistema za disanje (J00-J99)	1291	7,8	15,0
Bolesti sistema za varenje (K00-K93)	1173	7,1	13,6
Bolesti kože i potkož. tkiva (L00-L90)	400	2,4	4,6
Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva (M00-M99)	584	3,5	6,8
Bolesti mokr-polnog sistema (N00-N99)	944	5,7	10,9
Trudnoća, radjanje i babinje (O00-O99)	681	4,1	38,7*
Stanja u porodajnom periodu (P00-P96)	42	0,3	0,5
Urodjene nakaznosti, deformacije i hromozomske nenormalnosti (Q00-Q99)	40	0,2	0,5
Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi (R00-R99)	725	4,4	8,4
Povrede, trovanja i posledice delovanja spoljnih faktora (S00-T98)	582	3,5	6,7
Faktori koji utiču na zdr. stanje i kontakt sa zdravstvenom službom (Z00-Z99)	3243	19,7	37,6
UKUPNO	16472	100,0	190,8

- na 1000 žena starosti 15-49 godina (procena za 2016.godinu- 17578)

Grupa faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom čine 1/5 svih hospitalizacija stanovnika Topličkog okruga u 2016.godini (19,7%). Ukoliko izuzmemos hospitalizacije vezane za *trudnoću, porodaj i babinje*, stopa hospitalizacije je najviša i iznosi 37,6/1000 (Tabela 30).

Zbog *kardiovaskularnih bolesti* bilo je ukupno 2.043 epizode bolničkog lečenja, tako da stopa hospitalizacije iznosi 23,7%.


Maligne bolesti su bile razlog 1.778 epizoda stacionarnog lečenja i čine 10,8% bolničkog morbiditeta, a imaju stopu hospitalizacije - 20,6%.

Sledeća po frekventnosti je grupa *bolesti sistema za disanje*, koje sa 1.291 hospitalizacijom čini 7,8% bolničkog morbiditeta (stopa 15/1000) i nalazi se na četvrtom mestu.

U 2016.godini *bolesti sistema za varenje* bile su razlog da se hospitalizuje 1.173 puta neko od stanovnika Topličkog okruga (7,1% i stopa 13,6 promila).

Hospitalizacije u vezi sa *trudnoćom i porođajem* čine 4,1% ukupnog bolničkog morbiditeta, a navedenih pet grupa bolesti 57,8% hospitalno lečenih stanovnika Topličkog okruga 2016.godine.

Grafikon 9. Struktura bolničkog mortaliteta stanovništva Topličkog okruga 2016.god.



Medju umrlim stanovnicima Topličkog okruga, koji su bili stacionirani u nekoj od bolničkih zdravstvenih ustanova zbog dijagnostike, lečenja, rehabilitacije ili nege, dominiraju *kardiovaskularne bolesti* (Grafikon 9). Oboljenja iz ove grupe bila su uzrok smrti 77 hospitalizovanih osoba, što je 47,8% ukupno umrlih. Na drugom mestu su *tumori* (41 ili 24,4%), a na trećem *bolesti digestivnog sistema* (9 ili 5,4%). Sledi *bolesti nervnog sistema* (4,8%) i *bolesti mokraćno-polnog sistema*, kao i *povrede i trovanja* sa učešćem od 3,6% u ukupnom bolničkom mortalitetu. Udeo ostalih grupa je 3% ili manje.

Vodeći uzroci hospitalizacije stanovnika Topličkog okruga u 2016.godini ukupno i po polu, sa stopom hospitalizacije, prikazani su u tabeli 31.

Posmatrano prema pojedinačnim dijagnozama (ukoliko izuzmemo hospitalizacije zbog porodjaja), najčešći uzroci stacionarnog lečenja stanovnika **Topličkog okruga** su bili: *drugi posebni pregledi i ispitivanja osoba bez tegoba ili ranije dijagnoze, arterijska hipertenzija, druga medicinska nega, staračko zamućenje sočiva i zločudni tumor dušnika i pluća*. Medju prvi deset nalze se dijagnostičke kategorije prikazane u Tabeli .

Prva dva razloga hospitalizacije **muškaraca** su identična strukturi ukupnog bolničkog morbiditeta - *drugi posebni pregledi i ispitivanja osoba bez tegoba ili ranije dijagnoze i arterijska hipertenzija*, dok treće mesto pripada *prisustvu impantata i graftova na srcu i krvnim sudovima*.

Tabela 31. Vodeći uzroci hospitalizacije stanovništva Topličkog okruga, 2016.god.

Dijagnoza (šifra MKB-X)	Broj hospitalizacija	%	Stopa
UKUPNO	16472	100,0	190,8
Drugi posebni pregledi i ispitivanja osoba bez tegoba ili ranije dijagnoze (Z01)	1744	10,6	20,2
Arterijska hipertenzija (I10)	438	2,7	5,1
Druga medicinska nega (Z51)	425	2,6	4,9
Senilna katarkta (H25)	271	1,6	3,1
Zločudni tumor dušnika i pluća (C34)	263	1,6	3,0
Poremećeno varenje – dispepsija (K30)	259	1,6	3,0
Prisustvo implantata i graftova na srcu i krvnim sudovima (Z95)	258	1,6	3,0
Nestabilnost i vrtoglavica (R42)	256	1,6	3,0
Zapaljenje pluća, mikroorganizam neoznačen (J18)	251	1,5	2,9
Medicinsko posmatranje i praćenje zbog sumnje na neke bolesti ili stanja (Z03)	235	1,4	2,7
MUŠKARCI	7661	100,0	175,8
Drugi posebni pregledi i ispitivanja osoba bez tegoba ili ranije dijagnoze (Z01)	771	10,1	17,7
Arterijska hipertenzija (I10)	196	2,6	4,5
Prisustvo implantata i graftova na srcu i krvnim sudovima (Z95)	177	2,3	4,1
Zločudni tumor dušnika i pluća (C34)	172	2,2	3,9
Preponska kila (K40)	163	2,1	3,7
Senilna katarkta (H25)	130	1,7	3,0
Zapaljenje pluća, mikroorganizam neoznačen (J18)	121	1,6	2,8
Poremećeno varenje - dispepsija (K30)	124	1,6	2,8
Medicinsko posmatranje i praćenje zbog sumnje na neke bolesti ili stanja (Z03)	124	1,6	2,8
Treperenje i lepršanje pretkomora (I48)	116	1,5	2,7
ŽENE	8811	100,0	206,1
Drugi posebni pregledi i ispitivanja osoba bez tegoba ili ranije dijagnoze (Z01)	973	11,0	22,8
Druga medicinska nega (Z51)	331	3,8	7,7
Arterijska hipertenzija (I10)	242	2,7	5,7
Sideropenijska anemija (D50)	172	2,0	4,0
Spontani porodjaj kod jednoplodne trudnoće (O80)	158	1,8	9,0*
Kontrola normalne trudnoće (Z34)	145	1,6	8,2*
Senilna katarkta (H25)	141	1,6	3,3
Poremećeno varenje - dispepsija (K30)	135	1,5	3,2
Zapaljenje pluća, mikroorganizam neoznačen (J18)	130	1,5	3,0
Nestabilnost i vrtoglavica (R42)	122	1,4	2,9

- na 1000 žena starosti 15-49 godina (procena za 2016.godinu - 17578)

U 2016.godini *zločudni tumor dušnika i pluća* je bio na četvrtom mestu po učestalosti medju osobama muškog pola sa područja Topličkog okruga koje su stacionarno lečene. Slede: *preponska kila, staračko zamućenje sočiva i upala pluća* kod koje nije identifikovan uzročnik.

Najčešći razlog hospitalnog lečenja **žena** sa područja Topličkog okruga u 2016.godini jesu *drugi posebni pregledi i ispitivanja osoba bez tegoba ili ranije dijagnoze, druga medicinska nega i arterijska hipertenzija* (Tabela 31).

3. Organizacija, kadrovi, rad i korišćenje zdravstvene zaštite

3.1. Mreža zdravstvenih ustanova i kadrovi

Uredba o Planu mreže zdravstvenih ustanova (poslednje izmene i dopune objavljene u „Službenom glasniku RS“ br. 37/12, 8/14 i 92/15) utvrđuje broj, strukturu, kapacitete i prostorni raspored zdravstvenih ustanova u državnoj svojini i njihovih organizacionih jedinica po nivoima zdravstvene zaštite. Uredbom je određeno da, na području za koje je nadležan Institut za javno zdravlje Niš, zdravstvenu zaštitu stanovništva obezbeđuju 32 samostalne zdravstvene ustanove (22 na teritoriji Nišavskog upravnog okruga, 7 na teritoriji Topličkog upravnog okruga i 3 u opštini Sokobanja).

Na teritoriji **Topličkog okruga** u 2016.godini bilo je 969 zaposlenih (277 ili 28,6% nemedicinskih radnika). Zaposlenih zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom bilo je 279, sa višom i srednjom 690. Broj zaposlenih lekara iznosio je 232 (181 ili 78% specijalista), 23 stomatologa i 18 farmaceuta. U 2016.godini u Topličkom okrugu je radilo 2,7 lekara na 1000 stanovnika, u zdravstvenim ustanovama u državnoj svojini.

Podaci o kadrovima prikazani u **Tabeli** odnose se samo na zdravstvene ustanove iz Plana mreže (zdravstvene ustanove u državnoj svojini) sa zaposlenima na *neodređeno* vreme.


Tabela 32. Radnici u zdravstvenim ustanovama Topličkog okruga, 2009-2016. godine

Zaposleni		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zdravstveni radnici	Lekari	261	255	252	256	255	248	235	232
	Stomatolozi	35	35	37	37	34	29	33	23
	Farmaceuti	10	12	12	16	17	21	18	18
	Saradnici	6	6	6	6	6	5	6	6
	Svega	312	308	307	315	312	303	292	279
	Viša SS	68	68	74	79	80	79	91	82
	Srednja SS	664	663	648	651	635	619	613	608
	Niža SS	10	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno zdravstvenih radnika		1054	1770	1029	1046	1027	1001	986	969
Nemedicinski radnici		355	346	347	337	326	311	306	277
Ukupan broj radnika		1409	1385	1376	1383	1353	1312	1292	1246

Ukupan broj lekara za period 2009-2016.godine smanjio se za 11% (indeks 2016/2009=88,9%). Broj farmaceuta se povećao u istom periodu na području Topličkog okruga za 80%.

Ukupan broj radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u Topličkom okrugu se smanjio u ovom periodu za 8,1%. Povoljan je pokazatelj smanjenje i nemedicinskih radnika u periodu 2009-2016.god. za 22% (Tabela 32).

Grafikon 10. Kretanje broja zaposlenih zdravstvenih i nemedicinskih radnika u zdravstvenim ustanovama Topličkog okruga 2009-2016.god.



3.2. Rad i korišćenje zdravstvenih kapaciteta

3.2.1. Rad i korišćenje primarne zdravstvene zaštite

Primarnu zdravstvenu zaštitu u 2016.godini na teritoriji Topličkog okruga pružala su četiri doma zdravlja - DZ Blace, DZ Žitorađa, DZ Kuršumlija i DZ Prokuplje i Apoteka Prokuplje. U okviru DZ Kuršumlija nalazi se stacionar sa 20 postelja.

3.2.1.1. Služba opšte medicine

U službama opšte medicine na području **Topličkog okruga** 2016. godine bilo je zaposleno 58 lekara (Tabela 33) i 82 zdravstvena radnika sa srednjom i višom stručnom spremom. Odnos broja lekara/medicinskih sestara-tehničara je, u analiziranom periodu, oko 1:1,5. Broj korisnika po lekaru 2016.godine iznosi 1211 (normativ – 1 lekar na 1600 stanovnika).

Tabela 33. Kadrovi i posete u službama opšte medicine Topličkog okruga, 2009-2016.god.

Parametri	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Broj korisnika	61747	74866	75490	74863	74247	70637	71464	70259
Broj lekara	62	65	67	62	61	60	59	58
Broj korisnika na 1 lekara	996	1151,8	1127	1207	1198	1177	1212	1211
Broj medicinskih sestara	664	105	102	104	103	91	113	82
Broj medicinskih sestara na 1 lekara	1,5	1,6	1,5	1,7	1,3	1,5	1,9	1,4
Broj poseta	Ukupno	192109	381064	375594	343803	343370	314575	349945
	% preventivnih pregleda	-	0,1	0	0,0	0	2,0	0
	Dnevno po lekaru	11	26,6	25,4	25,2	25,6	23,8	26,4
	Po korisniku	3,1	5,1	5,0	4,6	4,6	4,5	4,9
								4,9

Prosečan broj pregleda po korisniku u ovom periodu se kretao oko 5, a prosečan broj poseta po lekaru od 11 (2009.godine) do 27 (2016.godine). Broj prijavljenih preventivnih pregleda, kroz izveštaje ove službe, je nula ili zanemarljivo mali broj: maksimalno 2% od ukupnog broja poseta (Tabela 33).

Velike su varijacije u pokrivenosti stanovništva **lekarima opšte prakse u Evropi**: od 34 lekara na 100.000 stanovnika u Monaku, do 160 u Francuskoj **2014.godine** (Slovenija 52/100.000, Hrvatska 57/100.000, Srbija 71/100.000, Evropski Region 62/100.000, EU 80/100.000 stanovnika). Pokrivenost populacije lekarima opšte medicine na području Topličkog okruga 2016.godine je 67 na 100.000 stanovnika.

3.2.1.2. Služba za zdravstvenu zaštitu radnika

U službama za zdravstvenu zaštitu radnika na području **Topličkog okruga** 2016. godine bilo je zaposleno 8 lekara i 12 zdravstvenih radnika sa srednjom i višom stručnom spremom (isto kao i prethodne godine). Odnos broja lekara/medicinskih sestara-tehničara je 1:1,5 (Tabela 34).

Tabela 34. Kadrovi i posete u službama za zdravstvenu zaštitu radnika na teritoriji Topličkog okruga, 2009-2016. god.

Parametri	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Broj korisnika	14571	13615	59266	48462	41249	16013	56248	55430
Broj lekara	10	10	10	10	9	9	8	8
Broj korisnika na 1 lekara	1457	1362	5927	4846	4846	1779	7031	6929
Broj medicinskih sestara	17	16	15	13	9	11	12	12
Broj medicinskih sestara na 1 lekara	1,7	1,6	1,5	1,3	1,0	1,2	1,5	1,5
Broj poseta	Ukupno	120983	139946	108056	107387	80157	112682	74983
	% preventivnih pregleda	-	1,9	2,7	2,0	3,3	3,3	5,7
	Dnevno po lekaru	43	63,6	49,1	48,8	40,5	56,9	41,7
	Po korisniku	8,3	10,3	1,8	2,2	1,9	7,0	1,3
								1,6

Prosečan broj pregleda po korisniku, u ovom periodu, jesmanjen sa 10 2010.godine na manje od 2 (1,6) 2016.godine. Poslednje kalendarske godine lekar je imao, prosečno, dnevno 48 posete/pregleda. Preventivni pregledi čine 2-6% ukupnog broja poseta (Tabela 34).

3.2.1.3. Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece

U službama za zdravstvenu zaštitu dece predškolskog uzrasta na području **Topličkog okruga** 2016.godini bilo je zaposleno 10 lekara i 14 zdravstvenih radnika sa srednjom i višom stručnom spremom. Odnos broja lekara/medicinskih sestara-tehničara je 1:1,4 (Tabela 35).

Broj dece 0-6 godina na jednog lekara zaposlenog u ovoj službi se smanjio sa 747 2009.godine na 525 u 2016.godini (normativ – 1 lekar na 850 dece).

Tabela 35. Kadrovi i posete u službama za zdravstvenu zaštitu dece predškolskog uzrasta Topličkog okruga, 2009-2016. godine

Parametri	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Broj korisnika	6727	6443	6190	5890	5481	5285	5306	5251
Broj lekara	9	13	11	11	9	8	9	10
Broj korisnika na 1 lekara	747	495,6	563	535	609	661	590	525
Broj medicinskih sestara	17	18	17	16	16	12	14	14
Broj medicinskih sestara na 1 lekara	1,9	1,4	1,5	1,5	1,7	1,5	1,6	1,4
Broj poseta	Ukupno	86866	84596	73602	73933	60560	72958	70146
	% preventivnih pregleda	-	13,5	14,7	15,8	14,8	11,1	14,0
	Dnevno po lekaru	34	29,6	30,4	30,6	30,6	41,5	34,6
	Po korisniku	12,9	13,1	11,9	12,6	11,0	13,8	13,2

Na teritoriji Topličkog okruga 2016.godine, prosečan broj poseta lekaru iznosi je 14 po detetu predškolskog uzrasta. Dnevna opterećenost lekara bila je 32 posete/pregleda. Preventivni pregledi su činili 10-15% svih poseta (Tabela 35).

3.2.1.4. Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine

U službama za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine na području **Topličkog okruga** 2016.god. bilo je zaposleno 10 lekara i 14 zdravstvenih radnika sa srednjom i višom stručnom spremom. Odnos broja lekara/medicinskih sestara-tehničara je 1:1,4 (Tabela 36).

Tabela 36. Kadrovi i posete u službama za zdravstvenu zaštitu dece školskog uzrasta Topličkog okruga, 2009-2016. godine

Parametri	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Broj korisnika	12658	13345	13102	12785	12785	12591	11148	10817
Broj lekara	11	12	12	13	12	11	9	10
Broj korisnika na 1 lekara	1151	1112	1092	983	1094	1145	1239	1082
Broj medicinskih sestara	16	14	14	17	19	15	13	14
Broj medicinskih sestara na 1 lekara	1,4	1,2	1,2	1,3	1,6	1,4	1,4	1,4
Broj poseta	Ukupno	89055	78794	76610	65102	58923	64713	62561
	% preventivnih pregleda	-	10,3	10,2	12,0	9,0	14,3	10,8
	Dnevno po lekaru	29,0	29,8	39,7	22,8	22,3	26,7	30,1
	Po korisniku	7,0	5,9	5,3	5,1	4,5	5,1	5,6

Na jednog lekara ove službe dolazi prosečno, u analiziranom osmogodišnjem periodu, 1112 školske dece (2016.godine 1082), a prema *Pravilniku* treba obezbediti jednog lekara za 1500 dece uzrasta 7-18 godina, a na deset ovakvih timova još jednu višu medicinsku sestruru.

Prosečan broj poseta po korisniku u ovom periodu smanjio se sa 7,0 u 2009.godini na 4,5 u 2013.godini. Poslednje godine analiziranog perioda iznosi 6 (Tabela 36). Dnevna opterećenost lekara u 2016. godini iznosila je 28 pregleda/poseta. Svaki deseti pregled, u proseku, pripada grupi preventivnih pregleda.

3.2.1.5. Služba za zdravstvenu zaštitu žena

U službama za zdravstvenu zaštitu žena na području **Topličkog okruga** 2016.godine bilo je zaposleno 7 lekara i 10 medicinskih sestara (odnos 1:1,4). Broj korisnika po lekaru je bio 5935 u 2009.godini, a nešto manji 2016.godine - 5269.

Dnevna opterećenost lekara smanjila se sa 29 u 2009.godini na 24,5 u 2016. godini. Prosečan broj poseta po korisniku je konstantno jedna poseta godišnje. Zastupljenost preventivnih pregleda je između 40% i 68% od ukupno prijavljenih kroz izveštaj službe (Tabela 37).

Tabela 37. Kadrovi i posete u službama za zdravstvenu zaštitu žena Topličkog okruga, 2009-2016. godine

Parametri		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Broj korisnika		41548	39723	39353	39214	39214	37815	37310	36880
Broj lekara		7	8	9	9	9	9	8	7
Broj korisnika na 1 lekara		5935	4965	4373	4357	4357	4202	4664	5269
Broj medicinskih sestara		10	10	10	10	10	10	10	10
Broj medicinskih sestara na 1 lekara		1,4	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3	1,4
Broj poseta	Ukupno	56610	50091	39795	50091	52293	40736	35635	38621
	% preventivnih pregleda	-	46,0	40,1	46,0	56,1	43,2	68,5	59,2
	Dnevno po lekaru	29	28,5	20,1	25,3	26,4	20,6	19,8	24,5
	Po korisniku	1,4	1,3	1,0	1,3	1,3	1,1	1,0	1,0

3.2.1.6. Služba za zaštitu i lečenje bolesti usta i zuba

Broj zaposlenih stomatologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na teritoriji **Topličkog okruga** 2016.godine, bio je 23, a broj stomatoloških sestara/zubnih tehničara 30 (odnos 1:1,2).

Tabela 38. Kadrovi i posete u službama za zdravstvenu zaštitu i lečenje bolesti usta i zuba Topličkog okruga u periodu 2009-2016. godine

Parametri		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Broj korisnika		95073	94570	93513	91754	90707	88513	87414	86327
Broj lekara		35	38	35	37	34	33	32	23
Broj korisnika na 1 lekara		2734,4	2489	2672	2480	2668	2682	2732	3753
Broj medicinskih sestara		41	49	46	45	45	42	39	30
Broj medicinskih sestara na 1 lekara		1,2	1,3	1,3	1,2	1,3	1,3	1,2	1,3
Broj poseta	Ukupno	83703	71277	64778	39795	69444	68201	66354	51414
	% preventivnih pregleda	-	10,3	13,0	40,1	8,3	78,8	7,1	15,3
	Dnevno po lekaru	8,5	8,5	8,4	4,9	8,3	9,4	9,2	10,0
	Po korisniku	0,9	0,8	0,7	0,4	0,8	0,8	0,8	0,6

Dnevna opterećenost stomatologa u ovom okrugu je bila konstanta u ovom periodu od 8-10 poseta/pregleda. Prosečan broj poseta po korisniku je gotovo nepromenjen i iznosi manje od jedne godišnje (Tabela 38). Treba imati na umu, da se radi o domovima zdravlja u državnoj svojini, te da je taj broj značajno veći, kada bi se analizirao rad i privatnih stomatoloških zdravstvenih ustanova.

3.2.2. Rad i korišćenje bolničke zdravstvene zaštite

Stacionarne zdravstvene ustanove na području **Topličkog okruga** 2016. godine imale su 379 postelja, od čega 359 u Opštoj bolnici „Dr Alekса Savić“ u Prokuplju i 20 u stacionaru opšteg tipa pri domu zdravlja Kuršumlija (ukupno 439 postelja na 100000 stanovnika okruga). Evropska unija, u proseku, ima 522 postelje/100000 stanovnika (2014.godine).

Ukupan broj postelja u zdravstvenim ustanovama Topličkog okruga bio je 356 - 2009.godine, a 379 - 2016.godine (Tabela 39). U osmogodišnjem periodu broj postelja se povećao za 6,5% (indeks $2016/2009=106,5\%$). Prosečna dužina lečenja je gotovo nepromenjena u osmogodišnjem periodu i iznosi približno 8 dana.

Tabela 39. Rad i korišćenje bolničke zdravstvene zaštite na teritoriji Topličkog okruga u periodu 2009-2016. godine

Parametri	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Broj lekara	61	65	57	57	56	57	59	58
Broj specijalista	57	59	50	46	46	45	47	45
Viša i srednja SS	207	213	224	224	227	216	232	222
Broj postelja	356	355	373	373	373	373	374	379
Bolesnički dani	90458	85324	89206	87514	86662	83576	83547	81507
Broj ispisanih pacijenata	11998	12300	11470	10962	11046	10800	10784	10627
Prosečna dužina lečenja	7,5	6,9	7,5	8,0	7,8	7,7	7,7	7,7
Zauzetost postelja (%)	69,6	65,8	69,6	64,3	63,6	60,9	61,2	58,9
Broj bolesnika na 1 lekara	197	189	211	192	197	190	183	183
Broj bolesnika na 1 MS	58	58	54	49	49	50	47	48
Broj lekara/100 postelja	17	18,3	16,0	15,3	15,0	15,3	16	15,3
Broj sestara/100 postelja	58	60	63	60	61	58	62	58,6

Iskorišćenost posteljnog fonda se blago smanjila sa 69,6% u 2009.godini na 58,9% u 2016.godini. Broj bolesnika na jednog lekara, uz manje oscilacije, ima tendenciju blagog pada i 2016.godine iznosi 183.

Broj lekara na 100 postelja je u blagom padu sa 18 u 2010.godini na 15,3 u 2016.godini. Broj sestara na 100 bolničkih postelja je nešto povoljniji i 2016. iznosi 58,6.

4. Analiza epidemiološke situacije

ZARAZNE BOLESTI	O/U	GODINE					Ukupno
		2012	2013	2014	2015	2016	
A02.0 Enteritis salmonellosa	O	9	6	10	5	2	32
	U						0
A03.1 Dysenteria bacillaris per Sh. Flexneri	O	3					3
	U						0
A04.5 Enteritis campylobacterialis	O		1		3	1	5
	U						0
A04.6 Enteritis yersiniosa enterocolitica	O					1	1
	U						0
A04.7 Enterocolitis per Clostridium difficile	O	5	36	63	82	74	260
	U		5		2	1	8
A04.9 Infectio intestinalis bacterialis non specificata	O	12	7	3	36	2	60
	U						0
A05.4 Intoxicatio alimentaria per Bacillum cereum	O	1					1
	U						0
A05.9 Intoxicatio alimentaria bacterialis, non specificata	O	68	58	58	7	3	194
	U						0
A07.1 Lambliasis	O	5	7	3	3	2	20
	U						0
A09 Diarrhoea et gastroenteritis causa infectionis suspecta	O	354	297	273	95	273	1292
	U	1		1		1	3
A15.0 Tuberculosis pulmonis, per microscopiam sputi confirmata	O	6	12	6	8	12	44
	U	1	2	0	1	2	6
A15.1 Tuberculosis pulmonis, solum culture confirmata	O	4	3	3	2	1	13
	U		1				1
A15.2 Tuberculosis pulmonis, per histologiam confirmata	O	1		1	1		3
	U						0
A15.3 Tuberculosis pulmonis, methodis non specificatis confirmata	O			1			1
	U						0
A15.6 Pleuritis tuberculosa, per bacteriologiam histologiam confirmata	O	1		1			2
	U						0

Tabela 1. Izveštaj o kretanju zaraznih bolesti u Topličkom okrugu od 2012. do 2016. godine

ZARAZNE BOLESTI	O/U	GODINE					Ukupno
		2012	2013	2014	2015	2016	
A15.7 Tuberculosis pulmonis primaria, per bacteriologiam et histologiam confirmata	O	1					1
	U						0
A15.8 Tuberculosis pulmonis, per bacteriologiam et histologiam alia	O	1					1
	U						0
A15.9 Tuberculosis organorum, per bacteriologiam et histologiam confirmata non specificata	O				1		1
	U						0
A16.0 Tuberculosis pulmonis bacteriologice histologice negativa	O	1	1				2
	U						0
A16.2 Tuberculosis pulmonis, sine confirmatione bacteriologica sive histologica	O			4	1	4	9
	U						0
A16.5 Pleuritis tuberculosa	O		1	1			2
	U						0
A16.7 Tuberculosis pulmonis primaria	O	1					1
	U						0
A16.8 Tuberculosis organorum respiratoriorum alia	O	1					1
	U						0
A17.0 Meningitis tuberculosa	O		1	1			2
	U						0
A18.2 Tuberculosis lymhoglandularum peripherica	O				1		1
	U						0
A21.9 Tularaemia, non specificata	O	1	1	12	24	3	41
	U						0
A27.9 Leptospirosis, non specificata	O			1			1
	U						0
A37.9 Pertussis, non specificata	O			1			1
	U						0
A38 Scarlatina	O	6	1				7
	U						0
A40.9 Septicaemia streptococcica	O		1		1		2
	U		1		1		2
A41.8 Septicaemia alia, specificata	O	10	18	25	32	42	127
	U		7	5	2	10	24
A51.9 Syphilis recens, non specificata	O			1			1
	U						0

Tabela 1. Izveštaj o kretanju zaraznih bolesti u Topličkom okrugu od 2012. do 2016. godine

ZARAZNE BOLESTI	O/U	GODINE					Ukupno
		2012	2013	2014	2015	2016	
A53.9 Syphilis alia et non specificata	O				1		1
	U						0
A56.8 Infectio chlamydialis modo sexuali transmissa	O	2	5	8	3	1	19
	U						0
A69.2 Morbus Lyme	O	6	5	6	6	8	31
	U						0
A92.3 Febris West Nile	O		1				1
	U		1				1
A98.5 Febris haemorrhagica cum syndroma renali	O			3			3
	U						0
B01.9 Varicella sine complicationibus	O	453	115	842	602	147	2159
	U						0
B05.9 Morbilli sine complicationibus	O				4		4
	U						0
B06.9 Rubeola sine complicationibus	O	5	7	1		1	14
	U						0
B15.9 Hepatitis A sine comate hepatico	O	22		6	1	1	30
	U						0
B16.9 Hepatitis acuta B sine delta agente	O	5	2	4	1	1	13
	U						0
B17.1 Hepatitis acuta C	O		3			1	4
	U						0
B17.2 Hepatitis acuta E	O				1		1
	U						0
B18.1 Hepatitis viralis chronica B sine delta agente	O	3		2	3	5	13
	U						0
B18.2 Hepatitis viralis chronica C	O	2		12	9	9	32
	U						0
B19.9 Hepatitis viralis, non specificata	O	1					1
	U						0
B20 Morbus HIV - morbus deficientiae immunitatis acquisitae cum morbis infectivis et parasitariis adjunctis	O				1		1
	U				1		1
B23 Morbus HIV cum statibus adjunctis aliis	O	1					1
	U						0

Tabela 1. Izveštaj o kretanju zaraznih bolesti u Topličkom okrugu od 2012. do 2016. godine

ZARAZNE BOLESTI	O/U	GODINE					Ukupno
		2012	2013	2014	2015	2016	
B26.9 Parotitis epidemica sine complicatione	O	4		1			5
	U	0		0			0
B27.9 Mononucleosis infectiva, non specificata	O	28	21	42	30	40	161
	U						0
B58.9 Toxoplasmosis, non specificata	O	2		3	2	7	14
	U						0
B67.0 Echinococcosis hepatis	O		1	3	2	2	8
	U						0
B86 Scabies	O	100	95	96	90	132	513
	U						0
G00.3 Meningitis staphilococcica	O			1			1
	U						0
G00.9 Meningitis bacterialis, non specificata	O		1	3	2		6
	U						0
G72.8 Flacid muscle paralysis	O			1			1
	U						0
J02.0 Pharingitis streptococcica	O		3	1	4	12	17
	U	0	0	0	0	0	0
J03.0 Tonsillitis streptococcica	O	36	21	28	19	7	111
	U						0
J10 Influenza, virus identificatum	O	3	3	4			10
	U						0
J11 Influenza, virus non identificatum	O	147	140	112	81	57	537
	U				2		2
J12 Pneumonia viralis	O	2	1		5		8
	U						0
J12.9 Pneumonia viralis, non specificata	O	170	94	52	124	147	587
	U	9	6	4	1	4	24
J13 Pneumonia pneumococcica	O			3			3
	U						0
J14 Pneumonia per Haemophilum influenzae	O			1		1	2
	U						0
J15 Pneumonia bacterialis	O	115	134	157	198	160	764
	U	0	1	1	5	4	11

Tabela 1. Izveštaj o kretanju zaraznih bolesti u Topličkom okrugu od 2012. do 2016. godine

ZARAZNE BOLESTI	O/U	GODINE					Ukupno
		2012	2013	2014	2015	2016	
J84 Pneumoniae interstitiales aliae	O	1		1		82	84
	U	1					1
UKUPNO	O	1599	1100	1861	1491	1241	7292
	U	12	24	11	15	22	84
Z21 Nosilaštvo antitela na HIV	O		1				1
	U						0
Z22.1 Izlučivanje uzročnika drugih salmoneloza,	O		3	1			4
	U						0
Z22.5 Nosilaštvo antigena virusnog hepatitisa B	O	1	2		3		6
	U						0
Z22.9 Nosilaštvo antitela na virusni hepatitis C	O	1	4	3			8
	U						0
Z24.2 Ozlede od životinja	O	56	24	23	34	20	157
	U						0

Operativnu evidenciju zaraznih bolesti na području Topličkog okruga radio je Centar za prevenciju i kontrolu bolesti Instituta za javno zdravlje u Nišu. U periodu od 2012. do 2016. godine prijavljeno je 7468 slučaja oboljenja i 84 smrtna slučajeva.

Srednja godišnja stopa morbiditeta od zaraznih bolesti u ovom periodu iznosila je **1463,24** na 100.000 stanovnika. Najveći broj obolelih prijavljen je 2014. godine i to, 1888 (incidencija je **1849,62** na 100.000 stanovnika), a najmanji 2013. godine 1134 (incidencija je **1110,95** na 100.000 stanovnika). Zarazne bolesti pokazuju trend opadanja u obolevanju ($y = -39,8x + 1613$, $R^2 = 0,0432$) za period od 2012. do 2016 godine .

U periodu od 2012. do 2016. godine prijavljena su **84** smrtna slučaja od zaraznih bolesti i to: Enterocolitis per Clostridium difficile – 8, Diarrhoea et gastroenteritis causa infectionis suspecta – 3, Tuberculosis pulmonis, per microscopiam sputi confirmata – 6, Tuberculosis pulmonis, solum culture confirmata – 1, Septicaemia streptococcica – 2, Septicaemia alia, specificata – 24, Febris West Nile -1 , Influenza, virus non identificatum – 2, Pneumonia viralis, non specificata – 24, Pneumonia bacterialis – 11, Pneumonia interstitiales aliae – 1, Morbus HIV – 1. Srednja godišnja stopa mortaliteta od zaraznih bolesti u posmatranom periodu iznosila je **16,46** na 100.000 stanovnika. Najveći broj umrlih prijavljen je 2013. godine – 24 (mortalitet je **23,51** na 100.000 stanovnika), a najmanji 2014. – 11 sa stopom mortaliteta od **10,78** na 100.000 stanovnika.

Tabela 2. DESET NAJČEŠĆE PRIJAVLJIVANIH ZARAZNIH BOLESTI I STANJA NA PODRUČJU TOPLIČKOG OKRUGA U PERIODU OD 2012. DO 2016. GODINE

R.b.	Bolest	Broj prijavljenih	*Mb/100 000	Broj umrlih	*Mt/100 000
1.	Varicella	2159	2115.11		
2.	Diarrhoea et gastroenteritis causa infectionis suspecta	1292	1265.74	3	2.94
3.	Pneumonia bacterialis	764	748.47	11	10.78
4.	Pneumonia viralis	595	582.90	24	23.51
5.	Influenza	547	535.88	2	1.96
6.	Scabies	513	502.57		
7.	Enterocolitis per Cl. difficile	260	254.71	8	7.84
8.	Intoxicatio alimentaria bacterialis	194	190.06		
9.	Mononucleosis infectiva	161	157.73		
10.	Ozlede od životinja	157	153.81		

*Mb - srednja godišnja stopa morbiditeta

*Mt - srednja godišnja stopa mortaliteta

Na području Topličkog okruga u periodu od 2012. do 2016. godine u strukturi opštег morbiditeta od zaraznih i parazitarnih bolesti dominantno mesto pripada kapljičnim zaraznim bolestima (61,13%). Procenat učešća se kreće od 49,03% 2013. godine do 70,88% 2015. godine. Srednja godišnja stopa morbiditeta od kapljičnih zaraznih bolesti u ovom periodu iznosila je 894,44 na 100.000 stanovnika. Respiratorne zarazne bolesti pokazuju trend pada obolenja ($y = -10.287x + 925.3$, $R^2 = 0.0032$). Od deset najčešćih bolesti u Topličkom okrugu pet je iz ove grupe: varičela sa 2159 slučajeva, pneumonia bacterialis sa 764 slučaja kao i virusna pneumonia sa 595 slučaja, grip sa 547 zabeleženih slučaja i mononucleosis infectiva sa 161 slučajem.

Kapljičnim zaraznim bolestima pripada 47 letalnih ishoda. Najviše smrtnih ishoda je zabeleženo kod obolelih od virusne neoznačene pneumonije – 24 i od bakterijske pneumonije – 11.

Crevne zarazne bolesti u strukturi opšteg morbiditeta od zaraznih bolesti učestvuju sa 25,23%. Procenat učešća se kreće od 15,05% 2015. godine do 35,98% 2013. godine. Srednja godišnja stopa morbiditeta od zaraznih bolesti u ovom periodu iznosila je 369,14 na 100.000 stanovnika. Crevne zarazne bolesti pokazuju trend pada obolevanja ($y = -40.362x + 490.23$, $R^2 = 0.5019$). U deset najčešćih bolesti u Nišavskom okrugu tri su iz ove grupe: diarrhoea et gastroenteritis causa infectionis suspecta sa 1292 slučajva, Enterocolitis per Cl. difficile sa 260 slučaja i Intoxicatio alimentaria bacterialis sa 194 slučaja.

Crevnim zaraznim bolestima pripada 11 letalna ishoda. Najviše smrtnih ishoda je zabeleženo kod obolelih od enterokolita uzrokovanih klostridijumom difficile – 8.

Sve ostale bolesti (polne, koje se prenose krvlju i parenteralno, parazitarne i vektorske) učestvuju u ukupnom morbiditetu sa 8,63%, od kojih najviše parazitarne zarazne bolesti sa 7,43%, zoonoze su nešto zastupljenije sa 3,13% (za to su pre svega zaslужne ozlede nastale od životinja) od krvnoprenosivih sa 2,8% ukupnog morbiditeta i najmanje pripada polnim bolestima – svega 0,28%.

U periodu od 2012. do 2016. godine od parazitarnih zaraznih bolesti najbrojniji je scabies sa 513 slučajeva i nalazi se na šestom mestu od deset najčešćih zaraznih bolesti. Od zaraznih bolesti koje se prenose krvlju brojnošću i smrtnošću dominiraju septikemije – 129 obolelih i 26 umrlih osoba.

Od polnih bolesti najviše je prijavljeno infectio chlamydialis modo sexuali transmisa – 19.

U posmatranom periodu na teritoriji Topličkog upravnog okruga prijavljene su tri epidemije. Sve epidemije su prijavljene u 2012. godini.

Hepatitis vir. A – U jednoj epidemiji na teritoriji opštine Prokuplje obolele su 33, a hospitalizovana je 31 osoba. U drugoj epidemiji prijavljenoj u opštini Kuršumlija obolele su i hospitalizovane 3 osobe. Obe epidemije su odjavljene. Put prenošenja je kontakt, a laboratorijski je potvrđen nalaz anti HAV IgM antitela.

Scabies – Jedna epidemija prijavljena je u opštini Kuršumlija, kada je oboleleo 16 osoba. Prijava je na osnovu kliničkog nalaza. Epidemija je odjavljena.

4.1. Imunoprofilaksa zaraznih bolesti– Toplički okrug

Vakcinacija OPV vakcinom realizovana je sa obuhvatom od 94% (2016.god.) do 99,0% (2013.). Revakcinacija OPV vakcinom u 2. godini beleži obuhvat od 83,9% (2016.) do 95,0% u 2012. godini. Kod revakcinacije OPV vakcinom u 7. godini obuhvat se kreće od 90,3% (2014.) do 99% (2012. godine). Obuhvat kod revakcinacije OPV vakcinom u 14. godini kreće se od 81,4% (u 2014 i 2015. godini) do 94,0,% (2012. godine).

Vakcinacija DTP vakcinom obavljena je sa obuhvatom od 94,0% (2016.godine) do 99,0% (2013.). Revakcinacija DTP vakcinom u 2. godini beleži obuhvat od 84,6% (2016.) do 96,2% (2012. godine). Kod revakcinacije DT vakcinom u 7. godini obuhvat se kreće od 90,3% (2014.) do 99,0% (2012. godine). Obuhvat dT vakcinom u 14. godini kreće se od 78% (2015.) do 95,8% (2016. godine.).

Obuhvat kod MMR vakcinacije kreće se od 83,6% (2016.) do 98,6% (2012.). Kod revakcinacije MMR vakcinom u 7. godini obuhvat se kreće od 89,9% (2014. godine) do 97,6% (2016.).

Kod vakcinacije BCG vakcinom obuhvat se kreće od 93,3% (2013.) do 95,8% (2015. i 2016.godine

Vakcinacija HB vakcinom beleži obuhvat od 80,7% (2015.) do 98,5% (2012. godine). Imunizacija HB vakcinom u 12. godini ima obuhvat od 83,8% (2014.) do 97,1% (2016.godine).

Kod većine vakcinacija i revakcinacija zabeležen je zadovoljavajući uspeh. Obuhvat je znatno veći u odnosu na Nišavski okrug, što ukazuje na veće angažovanje službi za imunizaciju imajući u vidu da su uslovi i raspoloživost vakcina bili podjednaki.

Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji protiv dečije paralize na teritoriji TOPLIČKOG OKRUGA

Godina	OPV			Revakcinacija u 2.			Revakcinacija u 7.			Revakcinacija u 14.		
	Plan	vakcin.	%	Plan	Revakcin.	%	Plan	Revakc.	%	Plan	Revakc.	%
2012	715	680	95,1	699	664	95,0	843	835	99,1	1053	990	94,0
2013	738	731	99,1	695	638	91,8	873	85	9,7	1001	881	88,0
2014	711	678	95,4	697	634	91,0	793	716	90,3	1075	875	81,4
2015	761	744	97,8	695	630	90,6	788	729	92,5	1363	1110	81,4
2016	734	690	94,0	732	614	83,9	737	712	96,6	953	814	85,4

Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji protiv difterije, tetanusa i pertusisa na teritoriji Topličkog okruga

Godina	DTP			Revakcinacija u 2.			Revakcinacija u 7.			Revakcinacija u 14.		
	Plan	vakcin.	%	Plan	Reakcin.	%	Plan	Revakc.	%	Plan	Revakc.	%
2012	713	685	96,1	694	668	96,3	843	835	99,1	1053	990	94,0
2013	738	731	99,1	695	638	91,8	851	815	95,8	1001	874	87,3
2014	711	678	95,4	692	634	91,6	793	716	90,3	1075	875	81,4
2015	756	713	94,3	695	630	90,6	790	737	93,3	1150	897	78,0
2016	734	690	94,0	732	619	84,6	736	725	98,5	966	925	95,8

Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji protiv morbila, rubele i parotitisa na teritoriji Topličkog okruga

Godina	Vakcinacija MMR			Revakcinacija MMR u 7. godini		
	Broj plan.	Broj vakc.	%	Broj plan.	Broj revakc.	%
2012	734	724	98,6	841	819	97,4
2013	706	675	95,6	851	828	97,3
2014	726	661	91,0	793	713	89,9
2015	705	671	95,2	778	726	93,3
2016	702	587	83,6	741	723	97,6

Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji protiv tuberkuloze na teritoriji Topličkog okruga

godina	Broj plan.	Broj vakc.	%
2012	719	686	95,4
2013	692	646	93,4
2014	682	641	94,0
2015	684	655	95,8
2016	666	638	95,8

Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji protiv hepatitisa B na teritoriji Topličkog okruga u periodu

godina	Hep. B vakcinacija u prvoj godini sa tri doze			Hep. B vakcinacija u 12. godini sa tri doze		
	Br. plan.	Br. vakc.	%	Br. plan.	Br. Vakc.	%
2012	749	738	98,5	970	820	84,5
2013	722	692	95,8	1017	968	95,2
2014	728	676	92,9	903	757	83,8
2015	1435	1158	80,7	900	841	93,4
2016	717	667	93,0	933	906	97,1

Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji protiv oboljenja izazvanih Haemophilusom influenzae tip b na teritoriji Topličkog okruga.

godina	Hib vakcinacija / DTaP-IPV-HiB		
	Br. plan.	Br. vakc.	%
2012	713	674	94,5
2013	734	718	97,8
2014	726	701	96,6
2015	761	744	97,8
2016	734	690	94,0

4.2. Bolničke infekcije 2012-2016

U posmatranom periodu Opšta bolnica Aleksić prijavila je 58 bolničkih infekcija. Od ukupnog broja bolničkih infekcija 54 su infekcije sistema za varenje uzročnik je clostridium difficile, dok su 4 bile infekcije urotrakta.

4.3. Kontrola i prevencija nezaraznih bolesti

Obolevanje i umiranje od masovnih hroničnih nezaraznih bolesti u populaciji Topličkog okruga, period 2012 – 2016. godina

Uvod

Zakonskim propisima regulisana je obaveza zdravstvenih radnika i zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji o prikupljanju podataka i vođenju registara obolelih i umrlih od 11 (jedanaest) oboljenja iz grupe masovnih hroničnih nezaraznih bolesti (u daljem tekstu: MHNB). Vođenje registara ima za cilj sagledavanje osnovnih epidemioloških karakteristika obolevanja i umiranja od ovih bolesti i preduzimanje što adekvatnijih preventivnih mera za smanjenje obolevanja/umiranja od istih. Odsek za masovne hronične nezarazne bolesti, Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, Instituta za javno zdravlje u Nišu u obavezi je da vodi populacione Registre MHNB za teritoriju Nišavskog i Topličkog okruga i to:

1. raka i leukemije,
- 2.endemske nefropatijske,
- 3.psikoze,
- 4.šećerne bolesti,
- 5.reumatske groznice,
- 6.progresivne mišićne distrofije,
- 7.hemofilije,
- 8.hronične insuficijencije bubrega,
- 9.narkomanije,
- 10.koronarne bolesti srca, i
- 11.opstruktivne bolesti pluća.

Podaci o obolelima/umrlima od: malignih bolesti, šećerne bolesti i akutnog koronarnog sindroma prikupljeni aktivnim i pasivnim načinom unose se u kompjuterske baze podataka, obrađuju i dostavljaju Republičkom Institutu za javno zdravlje gde se vode populacioni registri za celokupnu teritoriju Republike Srbije izuzev Kosova i Metohije. Podaci za ostale MHNB koje su po predviđenoj zakonskoj regulativi evidentiraju i prate na navedenom odseku za teritoriju oba okruga takođe se unose u kompjuterske baze podataka, obrađuju i na osnovu dostupnih podataka vrši analiza obolevanja/umiranja i od ovih bolesti.

Na teritoriji Topličkog okruga u periodu 2012. – 2016. godina od MHNB koje podležu obaveznom prijavljivanju ukupno je obolelo 4948 osoba a umrlo 3656. Prosečna nestandardizovana stopa incidencije iznosila je 1078,5/100.000 stanovnika a prosečna nestandardizovana stopa mortaliteta iznosila je 796,9/100.000. Najviša nestandardizovana stopa incidencije zabeležena je u 2014. godini (1534,5) dok je najniža nestandardizovana stopa incidencije zabeležena u 2016. godini (856,6). Najviša nestandardizovana stopa mortaliteta beleži se u 2016. godini (1137,8) a najniža u 2014. godini (554,7).

Učešće u obolevanju od MHNB u pomenutom periodu prikazana je na tabeli 1.

oboljenje	%	oboljenje	%
Maligne bolesti	51,7	Narkomanija	0,4
Šećerna bolest (DM)	21,6	Hemofilija	0,02
Akutni koronarni sindrom (AKS)	20,6	Progresivna mišićna distrofija	0
Opstruktivna bolest pluća (HOBP)	2,5	Endemska nefropatija	0
Hronična bubrežna insuficijencija (HBI)	2,4	Reumatska groznica	0
Psihoze	0,8		

Najveće učešće u obolevanju beleže maligne bolesti a najmanje hemofilija. Na osnovu dospelih prijava ne beleži se obolevanje od progresivne mišićne distrofije, endemske nefropatije i reumatske groznice.

Učešće u umiranju od MHNB u pomenutom periodu prikazana je na tabeli 2.

oboljenje	%	oboljenje	%
Maligne bolesti	37,7	Narkomanija	0
Akutni koronarni sindrom (AKS)	22,8	Hemofilija	0
Šećerna bolest (DM)	19	Progresivna mišićna distrofija	0
Opstruktivna bolest pluća (HOBP)	10,3	Endemska nefropatija	0
Hronična bubrežna insuficijencija (HBI)	9,5	Reumatska groznica	0
Psihoze	0,7		

Najveće učešće u umiranju beleži se kod malignih bolesti a najmanje kod psihoza. Na osnovu dospelih podataka ne beleži se umiranje od narkomanije, hemofilije, progresivne mišićne distrofije, endemske nefropatije i reumatske groznice.

4.3.1. Obolovanje od malignih tumorâ u populaciji Topličkog okruga period 2012 – 2016. godina

U navedenom periodu od malignih bolesti ukupno je registrovano 1926 novoobolelih (1062 muškarca i 864 žena) sa prosečnom nestandardizovanom stopom incidencije od 419,8/100. 000 stanovnika. Učešće obolelih muškaraca je nešto veće u odnosu na žene 55,1:44,9%. Distribucija obolovanja po uzrasnim grupama beleži više stope incidencije u starijim uzrasnim grupama (od 55 –te godine života) i to kod oba pola.

Vodeće lokalizacije u obolevanju od malignih tumora kod oba pola prikazani su na tabeli 3.

muškarci		žene	
lokalizacija	%	lokalizacija	%
pluća i bronh	22,9	dojka	22,1
kolon/rektum	10,6	pluća i bronh	8,3
prostata	10,4	grlić materice	8,1
mokraćna bešika	7,5	kolon/rektum	7,9
želudac	5,8	koža	5,6
koža	5,7	telo materice	5,5
larynx	4,8	pankreas	4,3
jetra	3,7	jajnik	4,3
usna šupljina i pharynx	3,5	jetra	3,5
pankreas	3,1	mozak	3,4
mozak	2,9	maligni melanom	3,1
bubreg	2,4	želudac	2,7
leukemije	2	usna šupljina i pharynx	2,2
maligni melanom	1,7	štitna žlezda	2,2
jednjak	1,5	bubreg	2
limfomi	1,4	mokraćna bešika	2
dr. lokalizacije	10,1	leukemije	1,8
		žučni putevi	1,6
		limfomi	1,6
		vulva	1,4
		dr.lokalizacije	6,4

Najučestalije lokalizacije malignih tumora kod muškaraca su: pluća i bronh, kolon/rektum i prostata a kod žena: dojka, pluća i bronh i grlić materice.

4.3.2. Obolovanje i umiranje od šećerne bolesti u populaciji Topličkog okruga period 2012 – 2016. godina

Šećerna bolest (u daljem tekstu: DM) je jedno od najčešćih masovnih hroničnih nezaraznih oboljenja i predstavlja veliki javno-zdravstveni problem. Iako se najviše stope incidencije registruju u razvijenim zemljama sveta, najveći porast broja obolelih očekuje se u zemljama u razvoju, gde spada i naša zemlja. Po rasprostranjenosti i učestalosti javljanja, dužini lečenja, komplikacijama koje ga prate, posledicama koje ostavlja i visokom mortalitetu, šećerna bolest predstavlja u zdravstvenom i socio-ekonomskom pogledu, jedan od najtežih problema savremene medicine i zdravstvene zaštite. Insulin-nezavisni dijabetes melitus (u daljem tekstu: INDM) čini 90% svih dijagnostikovanih oblika dijabetesa, dok ostali deo u učešću zauzima insulin-zavisni dijabetes melitus (u daljem tekstu: IZDM).

Tabela 4. Ukupan broj novoobolelih od dijabetes melitusa tip 1 u periodu 2012-2016. godine

	2012	2013	2014	2015	2016	ukupno
Muškarci	1	2	3	1	3	10
Žene	2	0	2	1	0	5
Ukupno	3	2	5	2	3	15

Ukupno je registrovano 15 novoobolelih, 10 muškaraca i 5 žena. Prosečan broj novoobolelih iznosio je 3, a prosečna godišnja nestandardizovana stopa incidencije iznosila je 3,3 na 100 000 stanovnika. Muškarci su u proseku 2 puta više obolevali od žena.

Tabela 5. Ukupan broj novoobolelih od dijabetes melitusa tip 2 u periodu 2012-2016.

	2012	2013	2014	2015	2016	ukupno
Muškarci	57	62	79	82	81	361
Žene	70	68	105	92	90	425
Ukupno	127	130	184	174	171	786

Ukupno je registrovano 786 novoobolelih i to 361 muškarac i 425 žena. Prosečan broj novoobolelih od tipa 2 bio je 157. Prosečna nestandardizovana godišnja stopa incidencije bila je 171,3 na 100 000 stanovnika. Žene su u proseku obolevale 1,2 puta češće od dijabetes melitusa tip 2 u odnosu na muškarce.

Tabela 6. Ukupan broj umrlih od dijabetes melitusa tip 1 u periodu 2012-2016.

	2012	2013	2014	2015	2016	ukupno
Muškarci	11	15	6	7	7	46
Žene	16	16	20	10	11	73
Ukupno	27	31	26	17	18	119

U naznačenom periodu ukupno je registrovano 119 umrlih i to 46 muškaraca i 73 žena. Prosečan broj umrlih iznosio je 24, a prosečna godišnja nestandardizovana stopa mortaliteta bila je 25,9 na 100 000 stanovnika. Žene su umirale u proseku 1,6 puta više nego muškarci.

Tabela 7. Ukupan broj umrlih od dijabetes melitusa tip 2 u periodu 2012-2016.

	2012	2013	2014	2015	2016	ukupno
Muškarci	7	14	12	12	9	54
Žene	12	15	21	6	12	66
Ukupno	19	29	33	18	21	120

Registrano je 120 umrlih, 54 muškog i 66 ženskog pola. Prosečan broj umrlih bio je 24, a prosečna godišnja nestandardizovana stopa mortaliteta bila je 26,2 na 100 000 stanovnika.

4.3.3. Obolevanje i umiranje od akutnog koronarnog sindroma u populaciji Topličkog okruga period 2012 – 2016. godina

Akutni koronarni sindrom (u daljem tekstu: AKS) je takođe jedan od najčešćih masovnih hroničnih nezaraznih oboljenja i predstavlja veliki javno-zdravstveni problem.

Tabela 8. Broj novoobolelih od AKS-a na teritoriji Nišavskog okruga u periodu od 2012. do 2016. godine

Godina	Pol		Svega
	M	Ž	
2012	234	155	389
2013	69	32	101
2014	189	174	363
2015	172	108	280
2016	62	33	95
Ukupno	726	502	1228

U posmatranom periodu ukupno je registrovano 1228 novoobolelih sa dijagnozom AKS (726 muškarca i 502 žene). Prosječan broj novoobolelih bio je 246. Prosječna godišnja nestandardizovana stopa incidencije iznosila je 267,7 na 100.000 stanovnika Topličkog okruga (prema popisu iz 2011.). Muškarci su u proseku obolevali 1,5 puta češće od žena.

Tabela 9. Broj umrlih od AKS-a na teritoriji Nišavskog okruga u periodu od 2012. do 2016. godine

Godina	Pol		Svega
	M	Ž	
2012	58	37	95
2013	50	46	96
2014	48	46	94
2015	47	22	69
2016	35	20	55
Ukupno	238	171	409

U posmatranom petogodišnjem periodu ukupno je registrovano 409 umrlih od AKS-a 238 muškaraca i 171 žena. Prosječan broj umrlih bio 81. Prosječna godišnja nestandardizovana stopa mortaliteta bila je 89,2 na 100 000 stanovnika. Muškarci su umirali prosečno 1,4 puta češće od žena.

Znatno manje učešće u obolovanju oko 6% i u umiranju oko 21% beleže druge MHNB koje se prate na Odseku za MHNB i zbog toga neće biti detaljnije analizirane.

5. Stanje životne sredine i higijenskih prilika

5.1. Kontrola kvaliteta vazduha 2012-2016

5.1.1. Sumpor dioksid

5.1.2. Čadž

5.1.3. Ukupne taložne materije

5.1.4. Suspendovane čestice

5.2. KONTROLA KVALITETA VODE 2012-2016

5.2.1. ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE

Zdravstveno bezbedna voda za piće odgovara normama važećeg Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće koji prihvata preporuke Svetske zdravstvene organizacije i Evropske unije i podleže kontinuiranom monitoringu koji realizuju ovlašćene zdravstvene ustanove određenom dinamikom i opsegom ispitivanja u akreditovanim laboratorijama.

Monitoring zdravstvene ispravnosti vode za piće na teritoriji Nišavskog i Topličkog okruga sprovodi Institut za javno zdravlje, preko Centra za higijenu i humanu ekologiju.

Metodologija: Monitoring se obavlja na osnovu ugovora sa vlasnicima objekata javnog vodosnabdevanja. Uzorkovanje voda za piće vrše u 99% slučajeva stručna lica Odeljenja za humanu ekologiju. Uzorci vode za piće su uzorkovani na mestima na kojima je voda za piće dostupna korisnicima - na slavini krajnjeg potrošača. Nakon adekvatnog transporta, vrši se prijem uzorka i započinju analize u akreditovanoj laboratoriji. Kompletan izveštaj o ispitivanju vode ima u svom sastavu i stručno mišljenje koje koncipiraju doktori medicine - specijalisti higijene. Stručnim mišljenjem se ocenjuje usaglašenost vode za piće normama Pravilnika i dozvoljava se ili zabranjuje upotreba vode. U slučaju neispravnosti vode, ukoliko ona podleže kontinuiranom monitoringu, daje se predlog mera za obezbeđivanje njene ispravnosti.

Zdravstvena ispravnost vode za piće na teritoriji Nišavskog i Topličkog okruga je i 2016. godine ispitivana dominantno u komunalnim vodovodima. Javne česme i seoski vodovodi nisu obuhvaćeni redovnim monitoringom.

Vodosnabdevanje na teritoriji TOPLIČKOG OKRUGA

Na teritoriji Topličkog okruga, IZJZ Niš je tokom 2016. godine kontrolisao četiri vodovoda (Prokuplje, Kuršumliju, Žitorađu i Blace).

Tokom 2016. godine iz komunalnih vodovoda je uzeto 704 uzorka vode na mikrobiološku i 703 uzorka na fizičko - hemijsku ispravnost. Razlozi su iz grupe parametara koji mogu izazvati primedbe potrošača (mutnoća, boja, pH); povećane organske materije, Mn, Fe i rezidualni hlor, ali u različitim uzorcima, tako da nije bilo opasnosti od stvaranja kancerogenih trihalometana.

Mikrobiološka neispravnost je dokazana u 6 uzoraka (0.85%), dok je fizičko - hemijska neispravnost zabeležena u 39 uzoraka (5.55%). Sa obzirom da je dokazana ispravnost ponovljenim uzorkovanjem, najverovatnije se radilo o problemu točećih mesta.

Vodovod u Prokuplju ima dva izvorišta - akumulaciju Bresnica sa fabrikom vode u kojoj se vrši prečišćavanje i dezinfekcija i bunare Grčki mlin odakle se voda na svom putu ka potrošaču samo dezinfikuje. Za vodovod Prokuplje kao veći sistem vodosnabdevanja, stručnim mišljenjem je ocenjivano stanje u komunalnom vodovodu na osnovu dnevne serije uzoraka.

Vodovod u Blacu ima jedno izvorište - akumulaciju Pridvorica sa fabrikom vode u kojoj se vrši prečišćavanje i dezinfekcija.

Vodovod u Kuršumliji ima jedno izvorište – voda se crpi iz reke Toplice, nakon čega ide u nalivna polja, odakle ide u podzemlje kroz filtersku ispunu, a kasnije se crpi iz bunara.

Dezinfekcija se radi u hlornoj stanici u sklopu samog izvorišta.

Iзвориште vodovoda u Žitoradi – čine bunari. Dezinfekcija se radi u hlornoj stanici.

U odnosu na tolerantne granice neispravnosti za komunalne vodovode (5% za mikrobiološku neispravnost i 20% za hemijsku), vodovodi na posmatranoj teritoriji su objekti vodosnabdevanja koji obezbeđuju zdravstveno bezbednu vodu za piće

Na **tabeli 1.** prikazana je distribucija broja uzoraka, broja neispravnih uzoraka i njihovog procenta **tokom perioda od 2012. zaključno sa 2016. godinom.** Razlog za taj prikaz je akreditacija laboratorije, veliki broj internih obuka uzorkivača i bolja organizacija i unapređenje rada na terenu, a sve je to imalo za cilj tačniji monitoring vode za piće na teritoriji Nišavskog i Topličkog okruga pa samim tim i egzaktnije izveštavanje.

Tabela 1. Higijenska ispravnost vode za piće iz komunalnih vodovoda Nišavskog i Topličkog okruga u periodu od 2012.-2016. godine

Redni broj	Godina	Mikrobiologija			Fiziko-Hemija		
		Broj uzoraka	Neispravnih		Broj uzoraka	Neispravnih	
			Broj	%		Broj	%
1.	2012	5953	43	0,72	5824	136	2,34
2.	2013	6479	47	0,7	6429	91	1,41
3.	2014	7061	35	0,5	7028	252	3,6
4.	2015	6192	24	0,39	6174	187	3,03
5.	2016	6046	61	1,01	6043	155	5,55
UKUPNO		31731	210	0,66	31498	821	2,61

Stanje vodosnabdevanja u komunalnim vodovodima ocenjujemo zdravstveno bezbednim, sa obzirom na mali procenat zabeleženih neispravnosti u analiziranim uzorcima u periodu od 2012.-2016. godine i kontinuiran monitoring koji sprovodi ovlašćena ustanova.

U tabeli 1 nisu prikazani uzorci prirodnih voda - voda izvorišta, koja se tretiraju propisanim metodama kondicioniranja, jer njih u prirodnom stanju potrošači urbanih sredina ne koriste.

U **tabeli 2.** prikazana je neispravnost u odnosu na ukupan broj uzetih uzoraka iz pojedinih vodovoda na teritoriji Nišavskog i Topličkog okruga tokom 2016. godine.

Tabela 2. Higijenska ispravnost vode za piće iz komunalnih vodovoda Nišavskog i Topličkog okruga tokom 2016. godine

Red. broj	Vodovod	MIKROBIOLOGIJA			FIZIKO-HEMIJA		
		Broj uzoraka	Neispravnih		Broj uzoraka	Neispravnih	
			Broj	%		Broj	%
NIŠAVSKI OKRUG							
1	NIŠ	4838	30	0.62% UKB, KBFP, AMB,SFP	4838	19	0.39% Boja, NTU,Fe,pH
2	ALEKSINAC	324	15	4.63% UKB, KBFP	324	54	16.67% Boja, KMnO4, Rez. Cl, Mn, El. prov., Nitrati
3	SVRLJIG	101	5	4.95% UKB, KBFP	101	9	8.91% Boja, NTU, Rez. Cl
4	GADŽIN HAN	41	3	7.32% AMB	39	0	0
5	MEROŠINA	38	2	5.26% SRK	38	34	89.47% El. prov.
UKUPNO NIŠAVSKI		5342	55	1.03%	5340	116	2.17%
TOPLIČKI OKRUG							
6	PROKUPLJE	292	0	0	292	8	2.74% NTU
7	KURŠUMLIJA	124	2	1.61% SFP	124	2	1.61% Boja, NTU
8	BLACE	251	3	1.2% UKB, KBFP, AMB,SFP	251	29	11.55% Boja, NTU, KMnO4, Rez. Cl, Mn, Ph, Fe
9	ŽITORAĐA	37	1	2.7% UKB, KBFP	36	0	0
UKUPNO TOPLIČKI		704	6	0.85%	703	39	5.55%
UKUPNO N+T		6046	61	1.01&	6043	155	2.56%

U Nišu je najveći broj uzetih uzoraka, jer se radi o velikom gradu koji se prati dnevnom dinamikom. Radi se o vršenju eksterne kontrole, jer JKP „Naissus“ ima svoju internu laboratoriju, u kojoj se godišnje analizira duplo više uzoraka. Razlozi neispravnosti su uglavnom loše održavanje unutrašnjeg distributivnog sistema, o kome treba da brine potrošač - vlasnik stambenog objekta. O zabeleženim neispravnostima obaveštava se Sektor sanitarne kontrole JKP-a i nakon uporedne analize, izvode se zajednički zaključci i sprovode se mere kojima se obezbeđuje ovako visok nivo ispravnosti uzoraka iz distributivne mreže.

U Aleksincu je dominantan razlog neispravnosti povećana koncentracija organskih materija, jer je izvorište vodosnabdevanja akumulacija Bovan. Taj organski supstrat remeti i postupak

dezinfekcije. Ipak, procenat neispravnosti uzorka je ispod dozvoljene norme SZO, pa se situacija i u ovom vodovodu ocenjuje zadovoljavajućom. Aleksinački vodovod takođe ima svoju internu laboratoriju.

Analize higijenske ispravnosti vode za piće u Komunalnom vodovodu u Svrljigu i Gadžinom Hanu. Svrljig i G.Han imaju izvorišta dobrog kvaliteta, a potencijalni problemi se javljaju samo kod obilnijih padavina i naglog topljenja snega.

Merošina ima izvorište sa elektroprovodljivošću iznad 1000, ali kako ovaj parametar ne predstavlja rizik po zdravlje i ovaj vodovod nije rizičan.

U Topličkom okrugu rezultati fizičko - hemijskih analiza su pokazali značajniju neusaglašenost sa Pravilnikom u JKP Blace. Veći procenat neusaglašenosti je rezultat lošeg stanja akumulacije Pridvorica i zastarelog postrojenja za prerađu vode.

Tabela 3. Higijenska ispravnost vode za piće iz komunalnih vodovoda oba okruga tokom 2016. godine

Red. broj	Vodovod	MIKROBIOLOGIJA		FIZIKO-HEMIJA			
		Broj uzorka	Neispravnih		Broj uzorka	Neispravnih	
			Broj	%		Broj	%
1	UKUPNO NIŠAVSKI OKRUG	5342	55	1.03% UKB, KBFP, AMB, SFP, SRK	5340	116	2.17% Boja, Mutnoća, Rez. Cl, KMnO4, Nitrati, Fe, Mn, El. Prov.
2	UKUPNO TOPLIČKI OKRUG	704	6	0,85% UKB, KBFP, AMB, SFP,	703	39	5.55% Boja, Mutnoća, KMnO4, Rez. Cl, Mn, Fe, pH
UKUPNO NO+TO		6046	61	1.01%	6043	155	2.56%

Razlozi neispravnosti sumarno za sve vodovode su iz grupe primedbi potrošača (mutnoća, boja, oksidabilnost, provodljivost, rezidualni hlor) ili problema točećeg mesta. Što se mikrobiologije tiče, kao razlog neispravnosti dominiraju UKB i ukupne aerofilne mezofilne bakterije koje predstavljaju indikator lošeg tretmana vode i zahtevaju bolje održavanje cevovoda do krajnjeg potrošača. Ponovljenim uzorkovanjem je dokazana zdravstvena ispravnost vode.

5.2.2. ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST BAZENSKIH VODA 2012 - 2016

Monitoringom bazenskih voda na teritoriji Nišavskog i Topličkog okruga tokom 2016. godine obuhvaćeni su objekti (zatvoreni bazeni - tokom cele godine i otvoreni bazeni - tokom sezone) u kojima je ukupno uzeto

538 uzorka na fizičko - hemijsku i 538 uzorka na mikrobilošku ispravnost (**tabele 1 i 2**).

Na teritoriji Nišavskog okruga, kontinuiranim monitoringom su obuhvaćeni **zatvoreni** bazeni:

- 3 bazena SC „Čair“ Niš (olimpijski, rekreacioni i dečiji),
- 5 bazena Instituta „Radon“ - Niška Banja (u hotelima „Radon“ i „Zelengora“, „Staro kupatilo“ i stacionar „Terme“, kao i bazen „Wellness“),
- bazen za hidroterapiju Klinike za fizikalnu medicinu KC Niš,
- rekreacioni bazen u Fitness klubu („Health & Active“).

Sezonski su praćeni **otvoreni** bazeni:

- bazeni SC „Čair“ Niš (olimpijski i dečiji),

- bazeni hotela „Tami trade“, „Aleksandar LENS“, „Panorama“, i „Svetlost Plus“,
- bazeni objekta Ledex – ogrank Francuz u Prvoj Kutini - Niš,
- baze „GREEN PARADISE“ u Niškoj Banji,
- baze „POSEIDON POOL“ u Nišu,
- bazeni „PASTIRIŠTE“ u Svrnjigu,
- bazeni „Paljina - POPOLEND“,
- baze „Oblačina“ u Opštini Merošina.

Na teritoriji Topličkog okruga monitoringom su obuhvaćeni otvoreni bazeni lokalne samouprave Kuršumlija, Prokuplje i Blace i zatvoren baze za hidroterapiju Opšte bolnice u Prokuplju, bazeni (otvoreni i zatvoreni) u Prolom i Lukovskoj banji i baze „Garetov konak“ u Prolom Banji.

Od ispitivanih uzoraka na teritoriji oba okruga, 6.51% uzoraka je bilo mikrobiološki neispravno, dok je fizičko - hemijska neispravnost zabeležena u 33.64% uzoraka. Slična situacija je beležena i predhodnih godina, tj., periodu od 2012-2016.g.

Poseban podzakonski akt za zdravstvenu ispravnost bazenske vode ne postoji, vode iz bazena se analiziraju kao vode za piće po strogim kriterijumima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl.list SRJ 42/99; 44/99) a stručno mišljenje se izdaje za vode za kupanje prema Zakonu o vodama (Sl.glasnik RS 30/2010).

Zabeležene nespravnosti treba uslovno shvatiti, sem mikrobiološke koja je preduslov za upotrebu vode u svrhu rekreacije ili hidroterapije. Kao razlog neispravnosti dominira rezidualni hlor, koji je posledica neadekvatnog režima dezinfekcije, naročito kod banjskih termalnih voda.

Zdravstvena ispravnost bazenskih voda na teritoriji Nišavskog i Topličkog okruga ocenjujmo kao zadovoljavajuću, s obzirom visok procenat mikrobiološke ispravnosti i na nepostojanje adekvatnih propisa vezanih za zdravstvenu ispravnost bazenske vode.

Tabela 1. Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja vode iz javnih bazena I-XII 2016.godini na teritoriji Nišavskog i Topličkog okruga

Red. broj	OPŠTINA	Vrsta (O/Z) i naziv bazena (ako postoji)	FIZIČKO-HEMIJSKI pregled vode				
			Broj uzetih uzoraka	neispravno		Razlog neispravnosti	
				broj	%		
NIŠAVSKI OKRUG							
1.	Niš	SC „Čair“ (3-Z)	89	12	13.48	Rez Cl. NTU	
2.	Niš	SC „Čair“ (2-O)	52	4	7.69	Rez Cl.	
3.	Niš	„Health & Active“ (1-Z)	12	2	16.67	Hloridi, El. Prov., KMnO ₄ , Rez Cl, NO ₃	
4.	Niš	Institut „Niška Banja“(5-Z)	133	21	15.79	Rez Cl, Miris, Boja	
5.	Niš	KC-fizikalna (1-Z)	12	6	50.0	Rez Cl., NTU	
6.	Niš	„Tami trade“ DOO (1-O)	11	1	9.1	Amonijak	
7.	Niš	„Lens DOO“ (1-O)	9	5	55.56	Rez Cl, KMnO ₄ ,	
8.	Niš	„Svetlost plus“ (1-O)	6	0	-	-	
9.	Niš	„POSEIDON POOL“ (1-O)	8	7	87.5	KMnO ₄ , Rez Cl, Miris, Amonijak	
10.	Niška Banja	„GREEN PARADISE“ (1-O)	10	3	30.0	KMnO ₄ , Amonijak, Hloridi, El. Prov.	
11.	Paljina	„POPOLEND“ (2-O) V i M + Tobogani	8	0	-	-	
12.	Merošina	„Oblačina“ (1-O)	8	3	37.5	Boja, KMnO ₄	
13.	Svrljig	„Brčkalište - Pastirište“ (1-O)	16	7	43.75	Rez Cl, Hloridi, El. Prov.	
14.	Niš	LEDEKS Prva Kutina	8	1	12.5	KMnO ₄	
15.	Niš	Panorama LUX	8	5	62.5	Rez Cl, Amonijak, KMnO ₄	
16.	Aleksinac	FEVKI	1	0	-	-	
UKUPNO NO			391	77	19.69	NTU, Boja, Rez Cl, Miris, KMnO ₄ , NO ₃ , Hloridi, Amonijak, El. Prov.	
TOPLIČKI OKRUG							
1.	Prokuplje	ZC-fizikalna OB „Aleksa Savić“ (1-Z)	12	8	66.67	Rez Cl, Miris, Hloridi, El. Prov.	
2.	Prolom banja	Hotel Radan (1-Z)	12	8	66.67	pH, Boja, Hloridi, KMnO ₄ , NO ₂	
3.	Prolom banja	Hotel Radan (2-O) V i M	26	22	84.6	pH, Rez Cl, KMnO ₄ , NO ₂ , Hloridi, Amonijak	
4.	Sur Prolom sezonski	Garetov konak (1-Z)	4	0	-	-	
5.	Lukovska banja	Hotel Jelak i Kopaonik (2-Z)	28	25	89.29	Mn, NO ₂ , El. Prov., Rez Cl, Miris	
6.	Lukovska banja	Hotel Jelak i Kopaonik (2-O)	45	41	91.1	Boja, Mn, El. Prov. Rez Cl, Miris	
7.	Kuršumlija	JP SPC (1-O)	8	0	-	-	
8.	Prokuplje	TSO (2-O) V i M	8	0	-	-	
9.	Blace	STTC BLACE	4	0	-	-	
UKUPNO TO			147	104	70.75	Boja, pH, Rez Cl, Miris, KMnO ₄ , NO ₂ , Mn, Hloridi, Amonijak, El. Prov.	
UKUPNO NO+TO			538	181	33.64	NTU, Boja, pH, Rez Cl, Miris, KMnO ₄ , NO ₂ , NO ₃ , Mn, Hloridi, Amonijak, El. Prov.	

Tabela 2. Rezultati mikrobiološkog ispitivanja vode iz javnih bazena I-XII 2016.godini na teritoriji Nišavskog i Topličkog okruga

Red. broj	OPŠTINA	Vrsta (O/Z) i naziv bazena (ako postoji)	MIKROBIOLOŠKI pregled vode			
			Broj uzetih uzoraka	neispravno		Razlog neispravnosti
				broj	%	
NIŠAVSKI OKRUG						
17.	Niš	SC „Čair“ (3-Z)	89	0	-	-
18.	Niš	SC „Cair“ (2-O)	52	0	-	-
19.	Niš	„Health & Active“ (1-Z)	12	0	-	-
20.	Niš	Institut „Niška Banja“ (5-Z)	133	4	3.0	UKB, KBFP, AMB, SFP
21.	Niš	KC-fizikalna (1-Z)	12	1	8.33	AMB
22.	Niš	„Tami trade“ DOO (1-O)	11	0	-	-
23.	Niš	„Lens DOO“ (1-O)	9	0	-	-
24.	Niš	„Svetlost plus“ (1-O)	6	0	-	-
25.	Niš	„POSEIDON POOL“ (1-O)	8	0	-	-
26.	Niška Banja	„GREEN PARADISE“ (1-O)	10	0	-	-
27.	Paljina	„POPOLEND“ (2-O) V i M + Tobogani	8	2	25.0	UKB, KBFP
28.	Merošina	„Oblačina“ (1-O)	8	1	12.5	SRK
29.	Svrljig	„Brčkalište- Pastirište“ (1-O)	16	0	-	-
30.	Niš	LEDEKS Prva Kutina	8	2	25.0	UKB, KBFP, AMB, SRK
31.	Niš	Panorama LUX	8	0	-	-
32.	Aleksinac	FEVKI	1	0	-	-
UKUPNO NO			391	10	2.56	UKB, KBFP, AMB, SFP, SRK
TOPLIČKI OKRUG						
10.	Prokuplje	ZC-fizikalna OB „Aleksa Savić“	12	0	-	-
11.	Prolom banja	Hotel Radan (1-Z)	12	1	8.33	AMB, SFP
12.	Prolom banja	Hotel Radan (2-O) V i M	26	0	-	-
13.	Sur Prolom	Garetov konak (1-Z)	4	0	-	-
14.	Lukovska banja	Hotel Jelak i Kopaonik (2-Z)	28	8	28.58	UKB, AMB, SFP, SRK
15.	Lukovska banja	Hotel Jelak i Kopaonik (2-O)	45	16	35.56	UKB, KBFP, AMB, SFP, SRK
16.	Kuršumlija	JP SPC (1-O)	8	0	-	-
17.	Prokuplje	TSO (2-O) V i M	8	0	-	-
18.	Blace	STTC BLACE	4	0	-	-
UKUPNO TO			147	25	17.0	UKB, KBFP, AMB, SFP, SRK
UKUPNO NO+TO			538	35	6.51	UKB, KBFP, AMB, SFP, SRK

5.3. Zdravstvena ispravnost namirnica i predmeta opšte upotrebe

Higijensko-sanitarni nadzor nad objektima za društvenu ishranu

U izveštajnom periodu izvršeno 60 sanitarno- higijenskih nadzora u objektima društvene ishrane na području osam opština Topličkog okruga.

U cilju objektivizacije sanitarno- higijenske situacije u objektima u toku nadzora uzimani su brisevi sa radnih površina, posudja i pribora, ruku i odeće zaposlenih u kuhinjama i gotovih obroka i namirnica (tabela 2).

Tabela 2. Analiza rezultata prilikom higijensko-sanitarnih nadzora u objektima za društvenu ishranu, u periodu od 2012- 2016.god.

R. Broj	Vrste objekta	Pregledano briseva			Pregledano namirnica			Uzrok neispravnosti
		Ukupno	Neispravnih	Ukupno	Neisprav	Broj	%	
1	KURŠUMLIJA	200	-	20	-	-	-	-
2	BLACE	200	-	20	-	-	-	-
3	PROKUPLJE	300	-	20	-	-	-	-
4	ŽITORAĐA	150	-	16	-	-	-	-
	UKUPNO	850	-	76	-	-	-	-

Ukupno je analizirano 850 briseva, a mikrobiološki neispravnih briseva nije bilo.

U izveštajnom periodu analizirano je 76 gotovih jela i pakovanih namirnica, a svi analizirani uzorci bili su mikrobiološki ispravni.

Zaključci i predlog mera

Analizom izabranih pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva **Topličkog okruga** došlo se do sledećih

ZAKLJUČAKA

I – DEMOGRAFSKA SITUACIJA

- ❖ Broj stanovnika se konstantno *smanjuje*
- ❖ Demografski *vrlo staro* stanovništvo: prosečna starost 2016.god. je 44 godine; svaki peti stanovnik ima više od 65 godina (zrelost stanovništva=21,7%)
- ❖ Stanovništvo Topličkog okruga pripada *regresivnom* biološkom tipu: ideo mlađih od 15 godina 2016.godine je 14,1% (manje nego prosek EU=15,6%), a starijih od 50 godina ima preko 40%
- ❖ *Niska* opšta stopa fertiliteta, *veoma niske* stope rađanja (manje od 10‰)
- ❖ *Vrlo visoke* opšte stope mortaliteta (preko 15‰) i porast ukupne standardizovane stope smrtnosti
- ❖ *Negativan* prirodni priraštaj („bela kuga“)
- ❖ Očekivano trajanje života sve *duže* i 2016.godine je Ž:M=77:72 god.
- ❖ *Veoma niske* stope mortaliteta odojčadi (manje od 10‰); dominira smrtnost u prvoj nedelji života
- ❖ Vodeći uzroci smrti su *KVB* i *tumori*, a grupa *simptomi, znaci i nenormalni klinički i laboratorijski* nalazi se među prvih pet, a 2016.godine je na trećem mestu
- ❖ *socijalno-ekonomski pokazatelji* su nepovoljni: naša zemlja je u vrhu liste evropskih zemalja prema stopi nezaposlenosti, svega petina zaposlenih u Topličkom okrugu radi u privatnom sektoru, među nezaposlenima je 40% bez kvalifikacija i 50% žena, prosečna mesečna zarada je 47436RSD 2016.godine
- ❖ supružnici prilikom sklapanja braka imaju više od 30 godina, a svaki treći brak se razvede.

Demografska slika odgovara razvijenim zemljama, izuzev u pogledu socijalno-ekonomskih pokazatelja koji su nepovoljni.

II – MORBIDITET

U **vanbolničkom morbiditetu** stanovništva koje je koristilo usluge službe *opšte medicine* 2016.godine dominiraju respiratorne i kardiovaskularne bolesti. Najčešće dijagnoze su *akutna upala ždrela* ili *povišen krvni pritisak*.

Vodeće grupe oboljenja u službi *medicine rada* su kardiovaskularne, respiratorne i mišićno-koštane bolesti. Najčešće dijagnoze su: *akutna upala ždrela* i *povišen krvni pritisak*.

Kod dece *predškolskog* uzrasta dominiraju respiratorna oboljenja. Druga na listi vodećih grupa bolesti jesu faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom,

u koju spadaju preventivne posete i aktivnosti. U 2016.godini bilo je prosečno 7 dijagnoza po detetu starosti 0-6 godina.

U službi za zdravstvenu zaštitu dece školskog uzrasta najmanje tri od pet nazastupljenijih dijagnoza pripadaju respiratornim oboljenjima. Najfrekventnija dijagnoza je *akutno zapaljenje ždrela i krajnika*, kao i kod predškolske dece. Prosečan broj dijagnoza po detetu školskog uzrasta u 2016.godini je 3-4.

Najčešći razlog poseta službi za zdravstvenu zaštitu žena su bolesti mokraćno-polnog sistema. One su najzastupljenije i čine 70-80% ukupnog morbiditeta ove službe. Najčešće pojedinačne dijagnoze su: *druga zapaljenja ženskih karličnih organa, cervicitis uteri, poremećaji menstruacije, bolesti dojke i preporodajni pregledi i druge kontrole trudnoće*.

U stomatologiji su najfrekventnije dijagnoze bile - *druge bolesti zuba i potpornih struktura i zubni karijes*. Od desetoro dece starosti 0-6 godina troje ima karijes. U školskom uzrastu karijes je još rašireniji, tako da svako treće dete ove populacije sa područja Topličkog okruga posećuje stomatologa u državnoj službi zbog lečenja karijesa. Ako se tome doda još i evidentirano oboljenje u privatnim stomatološkim ordinacijama, problem je očigledno epidemijskih razmara.

Vodeće mesto, u strukturi **bolničkog morbiditeta** stanovnika Topličkog okruga 2016.godine, imaju faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenom službom, bolesti sistema krvotoka, tumori, bolesti sistema za disanje i bolesti sistema za varenje. Prvo mesto je pripalo grupi Z00-Z99 prema MKB-X, najverovatnije, zbog činjenice da nismo izdvajali dnevne bolnice iz ukupnog korpusa dijagnoza.

Posmatrano prema pojedinačnim oboljenjima/dijagnozama (ukoliko izuzmemo hospitalizacije zbog porodjaja), najčešći uzroci stacionarnog lečenja stanovnika Topličkog okruga 2016.godine su bili: *drugi posebni pregledi i ispitivanja osoba bez tegoba ili ranije dijagnoze, arterijska hipertenzija, druga medicinska nega, staračko zamućenje sočiva i zločudni tumor dušnika i pluća*.

Ukupan broj *fatalnih ishoda* stacionarno lečenih stanovnika Topličkog okruga u zdravstvenim ustanovama na teritoriji Nišavskog, Topličkog okruga i Opštine Sokobanja u 2016.godini je 168, što daje opštu stopu bolničkog mortaliteta od 1,6% (ukupan broj hospitalizovanih stanovnika 10.346). Medju umrlima je bilo 46% žena i 54% muškaraca, a 79% starijih od 65 godina.

III – KADROVI I KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Uredbom o Planu mreže zdravstvenih ustanova je određeno da na teritoriji Topličkog upravnog okruga zdravstvenu zaštitu stanovništva obezbeđuje 7 samostalnih zdravstvenih ustanova: jedna opšta bolnica, jedna apoteka, četiri doma zdravlja (u Kuršumliji sa opštim stacionarom od 20 postelja) i Specijalna bolnica „Žubor“ u Kuršumlijskoj banji.

Na teritoriji **Topličkog okruga** u 2016.godini bilo je 969 zaposlenih (277 ili 28,6% nemedicinskih radnika). Zaposlenih zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremom bilo je 279, sa višom i srednjom 690. Broj zaposlenih lekara iznosio je 232 (181 ili 78%

specijalista), 23 stomatologa i 18 farmaceuta. U 2016.godini u Topličkom okrugu je radilo 2,7 lekara na 1000 stanovnika, u zdravstvenim ustanovama u državnoj svojini.

Ukupan broj radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama Topličkog okruga se smanjio u periodu 2009-2016.godine za 8%, lekara za 11%, ali i nemedicinskih radnika za 22%. Broj farmaceuta se povećao, a broj saradnika ostao na istom nivou.

Kadrovska obezbedjenost stanovništva zdravstvenim radnicima primarne zdravstvene zaštite je, posmatrano u celini, zadovoljavajuća i u skladu je sa *Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe*. Dnevna opterećenost lekara je veoma različita, kako po opštinama, tako i po službama.

Broj postelja je u blagom porastu u periodu od 2009.godine, tako da ukupan posteljni fond u hospitalnim zdravstvenim ustanovama na teritoriji **Topličkog okruga** u 2016. godini iznosi 379 postelja (439 na 100.000 stanovnika). Evropska unija, u proseku, ima 522 postelje/100000 stanovnika (2014.godine).

Prosečno, na 100 postelja obezbeđeno je 15 lekara i 59 medicinskih sestara/tehničara. Zauzetost postelja je izmedju 60 i 70%, prosečno u periodu 2009-2016.godina 64%. Manja je od proseka na nivou R. Srbije i u evropskom regionu - 86,7%. Prosečna dužina lečenja je gotovo nepromenjena i iznosi približno 8 dana.

III - EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA

Zaključak – zarazne bolesti:

1. Tokom godina smanjivao se broj prijavljenih slučajeva oboljenja
2. Dominiraju respiratorne zarazne bolesti u svakoj posmatranoj godini
3. Prijavljene su dve epidemije crevnih zaraznih bolesti i jedna epidemija iz grupe parazitarnih zaraznih bolesti i to sve u jednoj godini
4. Nema prijavljenih epidemija u porodici
5. Na osnovu analize svega navedenog epidemiološka situacija na teritoriji Topličkog upravnog okruga ocenjuje se kao nesigurna ali pod kontrolom zdravstvene službe.

Zaključak - masovne nezarazne bolesti

U proteklih pet godina učešće u obolevanju je na približno istom nivou, s'tim što je učešće u obolevanju od malignih bolesti veće i prelazi $\frac{1}{3}$ svih obolelih. Boljim i kompletlijim prijavljivanjem masovnih hroničnih nezaraznih bolesti dobila bi se realnija slika o zdravstvenom stanju stanovništva u ovom okrugu a samim tim i utvrđile adekvatne mere u suzbijanju obolevanja i umiranja od ovih bolesti. Osnovni problem u vođenju populacionih registara je zastarela zakonska regulativa (još iz 1980. god.) i veliki broj MHNB koji podleže obaveznom prijavljivanju. Donošenjem novih zakonskih propisa i pravilnika trebalo bi u većoj meri da precizira broj registara koje treba voditi u nadležnim Institutima i Zavodima ali i način njihovog vođenja. Smanjenjem broja MHNB koje podležu obaveznom prijavljivanju u mnogome bi doprinelo i na kvalitetu vođenja registara koji bi bili zakonom obavezni.

IV – STANJE ŽIVOTNE SREDINE I HIGIJENSKIH PRILIKA

Stanje vodosnabdevanja u komunalnim vodovodima na teritoriji Nišavskog i Topličkog okruga koje kontroliše IZJZ Niš, ocenjujemo zdravstveno bezbednim, s obzirom na mali procenat zabeleženih neispravnosti.

Zaključak - VODE ZA PIĆE I BAZENI

Od kad je počeo da važi Zakon o bezbednosti hrane, voda za piće iz komunalnih vodovoda predstavlja najkontrolisaniju namirnicu - zna se dinamika, broj uzoraka prema veličini vodovoda i da kontrolu vrši ovlašćena zdravstvena ustanova.

Tokom petogodišnjeg perioda 2012 - 2016. godine ukupno je analizirano oko 32000 uzoraka vode za piće iz komunalnih vodovoda na higijensku ispravnost. Ti vodovodi podležu kontinuiranom monitoringu i za ovlašćenu zdravstvenu ustanovu nema iznenađenja čak i kada se uvede vanredno stanje vezano za vodosnabdevanje. Stanje vodosnabdevanja u komunalnim vodovodima ocenjujemo zdravstveno bezbednim, obzirom na mali procenat zabeleženih neispravnosti u analiziranim uzorcima u periodu od 2012.-2016. godine i kontinuiran monitoring koji sprovodi ovlašćena ustanova. U izveštaju nisu prikazani uzorci prirodnih voda - voda izvorišta, koja se tretiraju propisanim metodama kondicioniranja, jer njih u prirodnom stanju potrošači urbanih sredina ne koriste. Zdravstveno bezbedna voda teče iz slavina komunalnih vodovoda na teritoriji Nišavskog i Topličkog okruga.

Kako nemamo uvid u vodosnabdevanje preko seoskih vodovoda za kompletну teritoriju Nišavskog i Topličkog okruga i preko javnih česama kao alternativnih vodnih objekata u naseljima, vodu iz ovih objekata ocenjujemo zdravstveno rizičnom i ne preporučujemo je za konzumiranje od strane potrošača.

Voda iz procesa proizvodnje hrane se takođe veoma studiozno sagledava u IZJZ Niš, bilo da potiče iz komunalnih vodovoda ili iz lokalnih sistema. Kako objekata koji proizvode hranu ima mnogo više, očekujemo intenzivniji monitoring vode iz procesa proizvodnje u narednom periodu.

Zdravstvena ispravnost bazenskih voda na teritoriji Nišavskog i Topličkog okruga ocenjuje se kao zadovoljavajuća, s obzirom na visok procenat mikrobiološki ispravnih uzoraka. Bazenske vode se prate prema strogim normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, s obzirom da poseban pravilnik o bazenskim vodama ne postoji. Zabeležene nespravnosti treba uslovno shvatiti, sem mikrobiološke koja je preduslov za upotrebu vode u svrhu rekreacije ili hidroterapije.

Zaključak – NADZOR NAD OBJEKTIMA ZA DRUŠTVENU ISHRAINU

Na osnovu izvršenih sanitarno-higijenskih nadzora, bakteriološke analize brijeva i uzoraka hrane možemo zaključiti da je sanitarno – higijenska situacija u objektima društvene ishrane bila zadovoljavajuća.

PREDLOG MERA

I – DEMOGRAFSKA SITUACIJA

Nepovoljni vitalno-demografski pokazatelji zahtevaju primenu raznovrsnih mera pronatalitetne politike, koje je država već započela. Posebno treba istaći nepovoljnu socijalno-ekonomsku situaciju, bez čijeg bržeg napretka neće biti ni skorih povoljnijih pokazatelja iz ove oblasti zdravstvene zaštite.

Izraženo starenje populacije, slično visoko razvijenim državama Evrope, podrazumeva aktivniju brigu o starima kroz razvijanje različitih oblasti zdravstvenog sistema: sa jedne strane briga o bolesnima i nesposobnima, a sa druge povećanje kvaliteta života starih, kroz timski rad vladinog i nevladinog sektora društva.

Visoko treće mesto u strukturi mortaliteta zauzimaju stanja iz dijagnostičke grupe R00-R99, što zahteva intenzivnu kontinuiranu edukaciju lekara-sertifikatora o pravilnom izboru i adekvatnom upisu osnovnog uzroka smrti u Potvrdu o smrti i ostale individualne izveštaje koji to zahtevaju.

II – MORBIDITET

U strukturi morbiditeta (vanbolničkog i hospitalnog), ali i mortaliteta dominiraju *hronična masovna nezarazna oboljenja*. Uz produženje životnog veka i izraženo starenje populacije, može se reći da je i na području Topličkog okruga ostvarena „epidemiološka tranzicija“.

Najviše su stope obolevanja i umiranja od bolesti *cirkulatornog sistema i tumora*. Stope su više nego u razvijenim zemljama Evrope, tako da je neophodan intenzivan programski rad na suzbijanju svih faktora rizika hroničnih masovnih nezaraznih bolesti, ali i efikasniji skrining malignih oboljenja.

III – KADROVI I KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Ukupan broj radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama Topličkog okruga se smanjio u periodu 2009-2016.godine kako zdravstvenih, tako i nemedicinskih radnika.

Kadrovska obezbedjenost stanovništva zdravstvenim radnicima primarne zdravstvene zaštite je, posmatrano u celini, na karju 2016.godine zadovoljavajuća i u skladu je sa *Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe*.

Značaj preventivnih pregleda, posebno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, je odavno poznat. „Prevention is better than treatment:...“, naslov je rada objavljenog u renomiranom naučnom časopisu *Population Health Metrics, 2014.godine*. Treba povećati obim preventivnih pregleda u svim službama, osim u zdravstvenoj zaštiti žena gde oni čine gotovo polovinu ukupnog rada ginekologa. Tzv. „besplatni preventivni pregledi“ ne postoje, jer vreme i rad zdravstvenog osoblja, upotrebljeni materijal i amortizacija opreme imaju svoju cenu. Potrebno je kroz promociju zdravlja podizati svest o neophodnosti ovakvih pregleda, izuzev kada se radi o zaraznim bolestima gde je neophodno da postoji zakonska obaveza i sankcije.

Broj postelja je zadovoljavajući (439 na 100.000 stanovnika). Evropska unija, u proseku, ima 522 postelje/100000 stanovnika 2014.godine (od 254 u Švedskoj do 759 u Austriji).

Prosečna zauzetost postelja je, u analiziranom periodu, niska što govori o nedovoljnoj iskorišćenosti bolničkih kapaciteta. Potrebno je razmotriti struktturnu i organizacionu preraspodelu u skladu sa evidentiranim potrebama stanovništva.

Uvod	2
1. Demografski i socio-ekonomski pokazatelji.....	4
1.1. Vitalno-demografske krakteristike.....	4
1.1.1. Teritorija i stanovništvo	4
1.1.2. Starosna i polna struktura	4
1.1.3. Rađanje i obnavljanje stanovništva.....	7
1.1.4. Smrtnost stanovništva (mortalitet).....	8
1.1.5. Prirodni priraštaj	15
1.1.6. Sklopljeni i razvedeni brakovi	16
1.2. Socijalno-ekonomski pokazatelji	17
2. Obolevanje stanovništva (morbidity).....	19
2.1. Vanbolnički morbiditet	19
2.1.1. Služba opšte medicine	19
2.1.3. Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece.....	23
2.1.4. Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine	25
2.1.5. Služba za zdravstvenu zaštitu žena	27
2.1.6. Služba za zaštitu i lečenje bolesti usta i zuba	29
2.2. Bolnički morbiditet i mortalitet.....	30
3. Organizacija, kadrovi, rad i korišćenje zdravstvene zaštite	33
3.1. Mreža zdravstvenih ustanova i kadrovi.....	33
3.2. Rad i korišćenje zdravstvenih kapaciteta	34
3.2.1. Rad i korišćenje primarne zdravstvene zaštite.....	34
3.2.1.1. Služba opšte medicine	34
3.2.1.2. Služba za zdravstvenu zaštitu radnika	35
3.2.1.3. Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske dece	35
3.2.1.4. Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine	36
3.2.1.5. Služba za zdravstvenu zaštitu žena.....	37
3.2.1.6. Služba za zaštitu i lečenje bolesti usta i zuba	37
3.2.2. Rad i korišćenje bolničke zdravstvene zaštite	38
4. Analiza epidemiološke situacije	39
4.1. Imunoprofilaksa zaraznih bolesti– Toplički okrug.....	46
4.2. Bolničke infekcije 2012-2016	49
4.3. Kontrola i prevencija nezaraznih bolesti.....	49
4.3.1. Obolevanje od malignih tumora u populaciji Topličkog okruga period 2012 – 2016. godina	50
4.3.2. Obolevanje i umiranje od šećerne bolesti u populaciji Topličkog okruga period 2012 – 2016. godina	51
4.3.3. Obolevanje i umiranje od akutnog koronarnog sindroma u populaciji Topličkog okruga period 2012 – 2016. godina	52
5. Stanje životne sredine i higijenskih prilika	54
5.1. Kontrola kvaliteta vode 2012-2016.....	54
5.1.1. Sumpor dioksid.....	54
5.1.2. Čađ	54
5.1.3. Ukupne taložne materije	54
5.1.4. Suspendovane čestice	54
5.2. KONTROLA KVALITETA VODE 2012-2016.....	54
5.2.1. ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE ZA PIĆE	54
5.2.2. ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST BAZENSKIH VODA 2012 - 2016.....	57
5.3. Zdravstvena ispravnost namirnica i predmeta opšte upotrebe	61
Zaključci i predlog mera.....	62