

VULVOVAGINITIS KOD DEVOJČICA

Vulvovaginitis je jedan od najčešćih ginekoloških problema devojčica pre puberteta. Praćen je neugodnim simptomima: vaginalnim sekretom, svrabom, crvenilom, iritacijom i osetljivošću, a uključuje različita stanja sa zapaljenjskom reakcijom. Vulvovaginitis kod devojčica je najčešće povezan sa lošom higijenom ili nespecifičnim iritansima (vešom od sintetike, kupkama, parfimisanim sapunima, tesnom odećom), ali može biti u sklopu bakterijske infekcije, enterobijaze, kožne bolesti vulve, anatomske anomalije ili je posledica antibiotske terapije, prisustva stranog tela ili seksualnog zlostavljanja.

Tegobe povezane sa vulvom su stresne i za dete i za njegovu porodicu, a pedijatrima često predstavljaju veliki dijagnostički i terapijski problem. Novije studije ukazuju da su bakterijske infekcije potvrđene kod jedne trećine devojčica sa vulvovaginitisom i da su izazvane respiratornom i crevnom florom ili polno prenosivim mikroorganizmima. Mikrobiološki pregled brisa vulve pruža uvid u mikrobnu floru i omogućava postavljanje etiološke dijagnoze infektivnog vulvovaginitisa, a samim tim i ordiniranje adekvatne terapije.

Terapija vulvovaginitisa kod devojčica pre puberteta je individualna. Akutna simptomatska infekcija sa izolovanim uzročnikom zahteva antimikrobnu terapiju prema antibiogramu, primjenjenu sistemski ili lokalno. Kod devojčica sa rekurentnim vulvovaginitisom i nosilaštvom *Streptococcus pyogenes* treba uključiti penicilinske preparate sa inhibitorima β-laktamaza. Za lečenje vulvovaginitisa koji nije izazvan specifičnim mikroorganizmom treba primeniti higijenske mere i zaštitne kreme i izbegavati tesnu odeću i druge iritanse.